

正和商標



正確藥效

"正和" 治憂 膜衣錠100公絲 (鹽酸查諾頓)

TRAZO F.C. Tablets 100mg "C.H." (Trazodone Hydrochloride)

“正和”治憂膜衣錠為一抗憂鬱之藥物，但不屬於Tricyclic或Tetracyclic等其它已知的抗憂鬱劑。它是一種Triazolopyridone 的衍生物。它對人類抗憂鬱的作用機轉尚不是十分明瞭，但它並不是MAO (monoamine oxidase)抑制劑，也不像安非他命類的藥物會產生CNS的刺激作用。在動物試驗中，顯示其能選擇性的抑制大腦回收神經激胺(serotonin)。本品經口服給藥後，吸收情形良好，而不會局限於身體的某一特定部位。如果空腹服用，血漿的尖峰濃度在1小時出現，如果與食物一起服用，則在2小時出現。本品幾乎全部在肝臟代謝，只有<1%以原來的形式存在於尿液及排泄物中。約75%的患者在服藥後兩星期內有明顯的療效，而約有25%的患者需2-4星期才有明顯的療效產生。

※成 分: Each F.C. Tablet contains:

Trazodone Hydrochloride100mg

※適應症: 治療各種型態之抑鬱症。

※用法用量: 1.起始劑量為每天150mg，分次服用，然後每3~4天依50mg/day的劑量增加，直到獲得適當的效應。然後保持在最低的有效劑量，一旦到達適當的療效後，可依病情逐漸減低劑量。

2.門診病人每天最大劑量不可超過400mg。

3.住院病人或較嚴重病患每天最大劑量不可超過600mg。

4.本藥須由醫師處方使用。

※警 語:「重鬱症(Major depressive disorder, MDD)和其他精神障礙之短期研究，發現小孩、青少年和年輕人服用抗憂鬱劑相較於安慰劑可能增加自殺意念及行為。任何人考慮使用(本藥品)或其他抗憂鬱劑於小孩、青少年和青年人時應評估臨床用藥之風險與效益。短期研究對於大於24歲以上之成年人服用抗憂鬱劑並無顯示有增加自殺意念或行為之風險，而對於65歲以上之老年人服用抗憂鬱劑，反而較服用安慰劑降低自殺之風險。憂鬱症或其他精神障礙疾病，本身即有自殺傾向之風險。無論任何年齡層之患者開始服用抗憂鬱劑時，健康照護者應嚴密監視其臨床病徵惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，並隨時與醫師聯絡。」

※副作用: 頭昏眼花、想睡、頭痛、反胃、嘔吐、虛弱、體重減輕、戰慄、口乾、心悸過速、高血壓、水腫、便秘、腹瀉、視力模糊、慌張、狼狽感、失眠、異物感、皮膚發疹。

※服用過量: 1.曾經有因併用本品及下列藥物過量而致死的病例發生。(如:酒精、酒精加chloralhydrate加diazepam, amobarbital, chlordiazepoxide或meprobamate)。
2.最嚴重的情形有異常勃起、呼吸停止、癲癇發作及ECG轉變。
3.任何一種副作用的徵狀都可能因服藥過量而加重。
4.當服用過量時，並無特殊的解毒劑，最好能立即洗胃，及使用強力利尿劑，以沖淡藥物的濃度。

※注意事項: 1.請與食物一同服用。

2.對Trazodone過敏者請勿服用。

3.有報告顯示服用Trazodone會導致異常勃起。患者若有勃起過久或不正常的勃起，則須立即停止服藥並告知醫生。可注射norepinephrine、epinephrine 或dopamine，約1/3的患者需以手術治療，有部份的患者會導致勃起功能減弱或陽萎。

4.由於服用本藥會導致頭昏眼花、想睡覺、所以病人在開車或從事其它需全神貫注的工作時特別謹慎。

5.當有頭昏眼花、輕微頭痛、無力或尿中帶血，請告知醫生。

6.避免與酒精或其它抗憂鬱劑一起服用。

7.懷孕婦女: 在兔子及大白鼠的動物實驗中，當給與15~50倍的人類最大劑量時，會增加先天性胎兒的比例。目前尚無完整的懷孕婦女的研究報告，因此懷孕婦女服藥時需謹慎考慮。

8.授乳婦女: 在大白鼠的乳汁中有發現Trazodone及其代謝產物，因此此藥可能會經由乳腺排出，故授乳婦女服藥時需謹慎考慮。

9.兒童: 目前尚無關於18歲以下兒童的安全性及有效性報告出現。

※包裝: 3~1000錠塑膠瓶裝及鋁箔金裝。儲存於25℃以下，避光處。

※賦形劑: Lactose Monohydrate、Powdered Cellulose、Prejel、Primojel、Magnesium Stearate、HPMC、Castor Oil

※許可證字號: 衛署藥製字第041350號

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路23號(新營工業區)