


喘治療劑

喘悅™ (胺非林)
長效錠持續型 225 公絲

Antiasth® (Aminophylline)
Slow Release Tablets 225mg

【成分】每錠含 Aminophylline225mg



【適應症】氣喘及支氣管痙攣。

【用法用量】

成人：每日早晚各一次每次一錠，必要時可增至每日二次每次二錠，如為預防長夜引起之氣管痙攣，可於就寢前服用一錠，必要時亦可同時服用二錠。

小兒：每日每公斤體重 12~20mg，八歲以上的兒童一次可服半錠至一錠，患有慢性氣喘的兒童，需要較高劑量，可每日每公斤體重給予 25~42mg 之間的劑量。


(註：服用時應整錠吞服不可嚼碎)

【臨床所見】

氣喘 (asthma) 之特徵為突發的呼吸困難和哮鳴、肺部過度膨脹、咳嗽和氣管囉音。其發生可能突發或潛隱，其持續時間有時很短，有時數週，症狀乃由於泛發性支氣管阻塞，如支氣管平滑肌緊縮、支氣管壁肥厚、支氣管粘膜水腫和分泌物衍積於支氣管腔的結果，有許許多多的因素會引起氣喘，包括過敏原、刺激物、運動、情緒變化以及感染等，適當的處理是：第一認清並去掉可能引起氣喘發作的因素，其次是給予病人足夠的水份和適當的藥品。

【作用機序】

1. 喘悅長效錠是經由阻斷 PDE 酵素(Phosphodiesterase)，從而鬆弛支氣管平滑肌之痙攣。



2. 抑制肥大細胞(Mast cell)分泌出使支氣管痙攣的物質。

【特點】

1.服用簡便，每日兩次，患者不必在工作、上課或閒暇活動中匆忙服藥。2. 24 小時預防支氣管痙攣，喘悅長效錠服用後能持續不斷地釋出，維持適當治療濃度。3.對擬交感經作用劑無效的患者 (Sympathomimetic resistant) 亦可發生作用，必要時可與 Sympathomimetic 吸入劑併用而有增益治療之效。4.無一般傳統性口服 Aminophylline 的不良副作用，傳統性 Aminophylline 藥效短且有刺激腸胃、噁心、腹瀉、不安、心悸等缺點。

【副作用】

因喘悅長效錠具有持續釋放的作用，使其沒有一般 Aminophylline 和其它 Xanthine 衍生物所引起的中樞經系統 (CNS) 刺激、頭痛、腸胃刺激等副作用。

【禁忌症】喘悅長效錠迄今無禁忌的報告。

【賦形劑】Calcium Phosphate、Methyl Cellulose 450、Magnesium Stearate

【包裝】2~1000 粒 瓶裝 潔密包

【參考書籍】1.The Extra Pharmacopoeia

2.Physician's Desk Reference(1986)

本藥須由醫師處方使用 | 衛署藥製字第 032286 號 | 電腦代號 DTA10 | ®註冊商標