

擬副交感神經興奮藥物

"元宙" **倍力舒** 錠 50毫克

Benecol Tablets 50mg "Y.C."

衛署藥製字第 056313 號

YUAN CHOU
PIC/S GMP

【成分】Each tablet contains:

Bethanechol chloride.....50mg

Bethanechol chloride, 為膽鹼樣之酯類化合物, 在化學上為2-hydroxyl-propyl-trimethylammonium chloride之氫基碳酸鹽, 為白色吸溼性結晶化合物, 極易溶於水。

- 【作用】1. Bethanechol chloride主要作用在促進副交感神經之興奮, 可增加逼尿肌之張力, 使膀胱收縮, 而利排尿, 亦可增加腸胃之活動及緊張力, 使胃腸恢復已受損之節律性蠕動。
2. 副交感神經興奮, 可在神經末梢處放出 Acetylcholine, 雖然可以給予 Acetylcholine, 但很快就會被 Cholinesterase (膽素酯酵素) 所破壞, 作用僅是一時性的。而 Bethanechol chloride 不會被 Cholinesterase 所破壞, 故較 Acetylcholine 作用時間長而持久。促進排尿及增加胃腸之蠕動。通常治療劑量不會興奮神經節或隨意肌, 也不會影響心臟節律、血壓或周邊血液循環。
3. Bethanechol chloride 於體液中極為安定, 故以口服就能獲得不亞於注射之效果, 且其作用不影響循環系統, 而以選擇性作用於消化器及膀胱之平滑肌, 並由於能促進逼尿肌張力, 故特別對於胃弛緩及手術後之腹部膨滿、尿閉之治療具有優異效果。

【適應症】急性手術後及分娩後功能性尿液滯留及神經性膀胱無力症。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。劑量及用法, 應因人及病情而異。空腹服用, 如於飯後服用, 可能引起噁心及嘔吐。

通常成人1次10~50mg, 一天3~4次, 初劑量可從最低作用量5~10mg開始, 之後可每小時服用相同劑量, 直到獲得滿意效果, 或達劑量50mg為止。

【禁忌症】勿用於甲狀腺功能過高症、懷孕、胃潰瘍、支氣管哮喘、心搏徐緩、低血壓; 冠狀動脈疾病、癲癇、帕金森氏症、胃腸或泌尿道有機械性阻塞之病例。

【注意事項】在尿液滯留情形下, 括約肌無法在bethanechol收縮膀胱時放鬆, 這時可能會迫使尿液逆流經過輸尿管而回到腎盂, 若病人有菌尿症, 可能會造成回流性感染。

【副作用】腹部不適、流涎、皮膚潮紅及灼熱感、流汗。大劑量時可致副交感神經興奮作用, 例如疲倦頭痛、面部潮紅及灼熱感、絞痛、腹瀉、噁心、噯氣、腹鳴、氣喘、血壓降低。

Atropine為特效之解藥, 應經常準備之, 以便萬一毒性症狀發生時應用之。

【賦形劑】Silicon dioxide hydrated、Cellulose microcrystalline、Povidone k-90、Calcium carboxymethylcellulose、Tartrazine aluminum lake、Stearic acid、Croscarmellose sodium、Dibasic calcium phosphate。

【儲存條件】25℃以下儲存, 放置於小孩拿不到之處。

【包裝】6~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



元宙化學製藥股份有限公司

YCP 南投市南崗工業區南崗三路272號 MADE IN TAIWAN

☎ 049-2253190

服務時間8:00~17:00 (例假日除外)

網址<http://www.yuanchou.com.tw>