

滋骨[®]

加強咀嚼錠

BIO-CAL[®]

PLUS Chewable Tablets

藥理作用：

1. BIO-CAL[®] PLUS含磷酸鈣(Tribasic calcium phosphate)及維生素D₃ (Cholecalciferol)能有效提供造骨所需之鈣、磷礦物質，及促進鈣、磷吸收之維生素D₃。
2. BIO-CAL[®] PLUS因主成分為Tribasic calcium phosphate，不會產生二氧化碳氣體(CO₂)，而其他碳酸鈣製劑在胃酸作用下均產生CO₂而導致脹氣之副作用。

成分：每錠含

Tribasic calcium phosphate (equivalent to calcium 450 mg)..... 1203 mg
Cholecalciferol..... 330 IU

賦形劑：

Lactose spray-dried, Corn starch, FD&C red No.40 aluminum lake, Strawberry powder, PEG 8000, Magnesium stearate, Talc, Sodium saccharin

適應症：

預防鈣質與維生素D缺乏症，如骨質疏鬆症

用法用量：

每日2-3錠，飯後使用，請嚼碎服用

本藥須經醫師、藥師、藥劑生指示使用

禁忌症：

曾對本藥成分過敏者禁用之。

注意事項：

如同其他鈣鹽，可能引起便秘。當使用大量磷酸鈣時，在每週或血鈣過多初次顯現時應測定其血清中鈣濃度以及腎功能。腎功能不全及牛奶鹼性中毒症(milk alkali syndrome)患者應小心使用本藥。鈣鹽可能增強洋地黃苷類對心臟之作用。鈣鹽與四環素同時服用時亦可能干擾四環素之吸收。

副作用：

本藥過量時偶有高血鈣症，腎結石之病例發生。

警語：

- 一、請保存於陰涼之處避免陽光直射。並請妥善保管，防止兒童自行取用。
- 二、維生素及礦物質製劑僅可作為膳食攝取維生素及礦物質不足之輔助，不可取代均衡的飲食。
- 三、若您屬下列之情形，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生：
 - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦。
 - (二) 患有肝、腎疾病、心臟病或其他過敏或重大疾病之患者
 - (三) 使用者為幼童。
- 四、服用本品時，若須併用其他藥品、維生素及礦物質製劑或營養補充品，請攜本藥洽詢醫師藥師藥劑生。
- 五、請按本品之用法用量服用，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 六、服用後若有不適或產生以下情形，如：皮膚癢疹、噁心、嘔吐、脹氣、腹瀉等胃腸不適現象，請立即停藥就醫。
- 七、本藥含油性維生素，使用時勿超過建議劑量，油性維生素易發生蓄積性毒性。
- 八、本藥含維生素D，腎結石、肉樣瘤病、副甲狀腺功能亢進之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
- 九、本藥含礦物質，維持適當礦物質的平衡需要好的均衡飲食。長期補充高劑量的礦物質可能引起的副作用通常不清楚，而高劑量的單一礦物質會降低其他礦物質或維生素的生體可用率。
- 十、本藥含鈣，腎疾病或腎結石患者，應洽醫師診治後服用（過多的鈣可能會造成腎結石）。

包裝：

4~ 200錠鋁箔盒裝。

儲存條件：

請於25℃下儲存。

委 託 者： 台灣東洋藥品工業股份有限公司台北分公司
地 址：115台北市南港區園區街3-1號3樓之1
諮詢專線：0800-222166

製 造 廠：台裕化學製藥廠股份有限公司
廠 址：新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號