

“汎生”止寧膠囊 (妥內散敏)
Biosaren Capsules “Panbiotic” (Tranexamic acid)

衛署藥製字第 023220 號

[主成分]

每粒膠囊內含有：

Tranexamic acid.....250mg。

[賦型劑]

Corn Starch、Silicorn Dioxide Anhydrous、Explotab

[空膠囊 1# 成份表]

成分 1：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF

成分 2：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Erythrosine、Tartrazine、Purified Water、Glycerin

[藥效藥理] 依文獻記載

1. 抗 Plasmin 作用：能阻止 Plasminogen Activator 與 Plasmin 之作用，尤其對阻止 Plasminogen Activator 具有強力作用。
2. 出血抑制作用：依據前記載抗 Plasmin 作用而阻止纖維素溶解酵素作用，抑制血管脆化而得到止血的效果。
3. 抗過敏、抗炎症作用。
對 Kinin 或其他活性 Peptide 等引起血管透過性亢進過敏性、炎症性病變之原因(即 Plasmin 等) 具有抑制作用，故臨床上可以改善皮膚疾病、咽喉疾病之腫脹、發赤、搔癢等症狀。

[適應症]

全身及局部出血或出血性疾病。

[用法用量]

一日 750~2000mg，分三~四次服用，0-1 歲 75~200mg，2-3 歲 150~350mg，4-6 歲 250~650mg，7-14 歲 400~1000mg，15 歲以上 750~2000mg。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：依文獻記載

1. 慎重投予：

- (1) 血栓患者 (腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎等)。
- (2) 有消化性、凝固障礙者 (併用 Heparin 等)。

2. 副作用：

- (1) 過敏症：如皮膚搔癢感、發疹等，中止服用，其他亦有思睡現象。
- (2) 腸胃：有噁心、食慾不振、下痢的症狀出現。

[包裝貯存]：6-1000 粒塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

儲存於 25℃ 以下，避光貯存。



臺灣汎生製藥廠股份有限公司

高雄市鳥松區大同路 5-1 號 電話：(07)7317861