

蓋抹滅顆粒劑

NORIT CARBOMIX Granules for Suspension

衛署藥輸字第021549號

【成份】蓋抹滅顆粒劑每瓶含50公克或25公克活性碳或每袋鋁箔包含5公克活性碳之主成份外，尚含有檸檬酸、甘油和阿拉伯膠等賦型劑。

【適應症】緊急治療藥物或化學品中毒之病人。

【用法用量】指示用藥

瓶裝蓋抹滅顆粒劑，加入蒸餾水到標籤上之紅色線(50公克瓶裝約加400公撮，25公克瓶裝約加200公撮)後徹底搖勻。5公克鋁箔袋裝之蓋抹滅顆粒劑則輕輕投入玻璃杯中，加水約25-50公撮，並徹底混合均勻。均勻之懸浮液，可用以吸附引起中毒之各種毒性物質。

成人及12歲以上兒童之使用劑量及方法：

急性中毒時，儘快使用50-100公克之活性碳(1-2瓶)懸浮液。嚴重中毒時，服用初劑量後，每4至6小時應再服用20公克(約為160ml之懸浮液或4包鋁箔袋製成160公撮之懸浮液)，連續數天。對昏迷不醒的患者，在醫師或護士監督下，可經由鼻胃管給予懸浮液。

蓋抹滅顆粒劑可在嘔吐或洗胃後使用。

12歲以下兒童之使用劑量及方法：

活性碳用在小孩之推薦劑量是每公斤體重1公克之活性碳。

急性中毒時，依小孩之體重和中毒程度給2-10袋(每袋5公克)之劑量，幼兒初劑量給予是2-4袋，數分鐘後根據醫師指示，可重覆給藥；較大的小孩則儘量給予大劑量。(6-10袋)

【禁忌】患者必須使用口服藥劑或口服特殊之解毒劑時，不可使用活性碳。

【副作用、警語和注意事項】

發生中毒時先行使用蓋抹滅顆粒劑後，再立即送醫急救。服用蓋抹滅顆粒劑後大便將會變成黑色。由於其對腐蝕性物質引起之中毒無效，因此如確定是由腐蝕性物質引起之中毒，應避免使用本品。蓋抹滅對氰化物、鐵鹽、鋰鹽、甲醇、乙醇和乙二醇之吸附力差。這些都併用特殊之解毒劑：

毒物	特殊解毒劑
氰化物	亞硝酸鈉
鐵鹽	Deferoxamine
鋰鹽	Calcium polystyrene sulphate
甲醇	乙醇
乙二醇	乙醇

對許多中毒病例必須併用蓋抹滅顆粒劑和其特殊解毒劑，以達到確時解毒效果(如嚴重paracetamol中毒，須併用N-acetyl cysteine效果更佳。一般患者對蓋抹滅顆粒劑之接受性很好，只有少數患者可能會有便秘或腹瀉現象，如發生便秘可以Liquid Paraffin, Lactulose或其他緩瀉劑治療。懷孕及哺乳：本品對胎兒及幼兒不會造成任何影響。

【交互作用】蓋抹滅顆粒劑通常會降低口服藥劑之效果，如降壓劑、類風濕關節炎治療劑等。當同時服用避孕藥時，則須請教醫師。

【包裝】1,000公克以下塑膠瓶裝及鋁箔袋裝

製造廠：Norit Cosmara B. V.
Nijverheidsweg Noord 74, 3812, P.M.,
Amersfoort the Netherlands.

藥商：科懋生物科技股份有限公司
地址：台北市南港區園區街3號14樓之1
TEL：(02)26557568