“柏理”康速龍錠 5 毫克（培尼皮質醇）

Compesolon Tablets 5mg“Pine Lawer”（Prednisolone）

【主成分】每錠含
Prednisolone……5mg
賦形劑：
Sodium Starch Glycolate，Lactose，Starch，Pregelatinized Starch，Crospovidone，Magnesium Stearate，Purified Water。

【適應症】
風濕性關節炎、風濕熱、骨關節炎、風濕性脊髓炎、氣喘、過敏性疾病。

【用法 / 用量】
1. 用於氣喘時，每一週內每天 30-60mg，以後遞減，每天維持量 10-30mg。
2. 嚴重之關節炎（風濕性）每天 30mg，輕症每天 20mg。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】
1. 急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
2. 對消化管障礙如胃腸潰瘍患者務請特別注意。
3. 因主要副作用爲引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟病患及高血壓患者應注意。
4. 糖尿病患者使用時，請注意增加 Insulin 之用量。
5. 對於有精神病因素者多加注意。
6. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。
7. 長期服用應定期做血液、X 光、眼睛、血壓、身高、體重等檢查。

【警語】
1. 長期服用此藥的兒童，應小心觀察其生長及發育情形。
2. 高劑量或長期治療者，不宜驟然停藥。應緩慢減低劑量並觀察病人反應。
3. 皮質類固醇會降低人體的免疫力而使感染容易擴散，如發覺徵狀有異或惡化，應立即告知醫生。
4. 治療期間，尤其是高劑量使用者，不宜接種疫苗。

【副作用】
可能引起肌肉無力，骨質疏鬆症、腹脹、噁心、嘔吐、食慾及體重增加、胃潰瘍，可能伴隨有穿孔或出血、傷口癒合能力不佳、皮膚變薄而脆弱、多毛症、頭痛、失眠、月經不規則、排汗增加、高血糖、眼內壓升高、產生類庫興氏（Cushingoid）症狀等。

【包裝】
4-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【貯藏】
請儲存於 25℃以下。

委託者：柏理貿易股份有限公司
地址：台北市 104 松江路 65 號 4 樓
訂貨專線：02-2500-6378 / 傳真：02-2503-7755
製造廠：應元化學製藥股份有限公司
台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL:(06)2654883(代表號)