

“明德”

立 消 樂 錠

DIMOTIL

REPE Tablets

“MEIDER”

成 份

每錠含：Pancreatin 212.5 mg 相當於 (Amylase 6500 Units、Lipase 8000 Units、Protease 450 Units) 依據 F.I.P.) Metoclopramide Monohydrochloride 5 mg。

說 明

Dimotil 可解除由胃腸運動及胰外分泌活性發生障礙，引起的胃腸症狀，如：腹漲感、噯氣、噁心、及胃部的緊張和壓迫感，Metoclopramide Monohydrochloride，可正常化胃及小腸的運動且可促進胃的排空，Pancreatin 則可替代或補充胰、酶的不足，促進食物的利用和吸收。

適 應 症

消化器機能異常 (噁心、嘔吐、腹部膨滿感)。

用法用量

一天三次，每次一至二錠，餐時服用。

類 別

本藥須由醫師處方使用。

警 語[依文獻記載]

使用含 Metoclopramide 成分藥品可能造成遲發性運動障礙(tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，且分析本品之使用型態，約 20% 病人使用超過 12 周，故不建議長期(超過 12 週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生 tardive dyskinesia 之風險者。

投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用 Metoclopramide 藥品相關的不良反應如肌張力失調(dystonias)及錐體外路徑反應(extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

禁 忌 症[依文獻記載]

由於可能引起運動不能的症狀，Dimotil 在給予 14 歲以下的小孩，特別是年紀較輕的小孩，必須嚴格的指示。

副 作 用[依文獻記載]

個別的情形-發生在小孩的較為顯著- Metoclopramide 可能引起運動困難的症狀(錐體外效應，如頭、頸和肩等部位肌肉的痙攣、動眼危象)如有這種情形必須停止 Dimotil 的治療，靜脈注射 Caffeine 或 biperiden (Akineton)可以迅速的除去痙攣，如停止治療，痙攣在數小時內即消失，鎮靜劑如 diazepam(Valium)亦可使用，在較高的劑量下偶爾有輕微的嗜眠及煩躁不安、溢乳現象。

與其他藥物的作用

Dimotil 不能與神經方面藥物一起使用，因其容易導致錐體外症狀的發生。

解痙藥也可能減低 Paspertin 的效果。

包 裝

6 ~ 1000 錠塑膠瓶及鋁箔盒裝。

儲存:25°C以下儲存

製造廠：明德製藥股份有限公司

地 址：桃園縣楊梅市民富路二段 360 號