

得立生錠 (的剎美剎松)

DORISON TABLETS (DEXAMETHASONE) "ROYAL"

衛署藥製字 第 019643 號

須由醫師處方使用

版本日期 2026-04-13

歷來副腎皮質荷爾蒙製劑 (Corticoids preparations) 使用於臨床甚為廣泛，Corticosteroids大致分為 Glucocorticoids 與 Mineralcorticoids 兩種，但是臨床應用於抗發炎及抗過敏，則以 Glucocorticoids為主，Glucocorticoids不僅它們具有抗炎性、抗過敏性效果，且對風濕性關節炎等症，亦發揮療效，又對鈉離子及水分的滯留性低，故能廣為應用。的剎美剎松 (Dexamethasone) 之口服吸收良好，耐受性佳，在目前腎上腺皮質類固醇類製劑中，勘稱較進步、較具效果的優良藥品。

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠含有Dexamethasone.....4mg

1.2 賦形劑

Lactose Fast Flow、L-HPC、Mg. stearate。

1.3 劑型

錠劑

1.4 藥品外觀

白色圓形一面直線刻痕

2 適應症

副腎皮質機能萎縮症、急性風濕性關節炎、支氣管性氣喘、膠原病、急性過敏病、皮膚病。

3 用法及用量

3.1 用法用量

成人初劑量每次1片，每天一次，以後可視病情酌增劑量至每次2片。

小孩初劑量每次半片，每天一次。

4 禁忌

急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

1.急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。

- 2.對消化管障礙，如胃腸潰瘍患者，務請特別注意。
- 3.因主要副作用為引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
- 4.糖尿病患者使用時，請注意增加Insulin之用量。
- 5.對於有精神病因素者多加注意。
- 6.服用本劑期間請充分補充蛋白質。

7 交互作用

目前尚無資訊

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊

9 過量

目前尚無資訊

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊

13 包裝及儲存

13.1 包裝

2 ~ 1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示

13.3 儲存條件

於室溫 (15~30°C) 避光、緊閉容器貯存。

製造廠

皇佳化學製藥股份有限公司

高雄市鳥松區埤埔里埔安街1號

藥商

皇佳化學製藥股份有限公司

高雄市鳥松區埔安街1號