

|            |           |                  |                            |
|------------|-----------|------------------|----------------------------|
| <b>健安心</b> | 50 毫克膜衣錠  | <b>ENTRESTO®</b> | 50 mg Film-Coated Tablets  |
| <b>健安心</b> | 100 毫克膜衣錠 | <b>ENTRESTO®</b> | 100 mg Film-Coated Tablets |
| <b>健安心</b> | 200 毫克膜衣錠 | <b>ENTRESTO®</b> | 200 mg Film-Coated Tablets |

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本藥須由醫師處方使用                                                                                                                                                                                      |
| <div><div><span></span></div><div><b>警語：胎兒毒性</b></div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>如果發現懷孕，應儘速停用 ENTRESTO®（參閱 5.1）</li> <li>作用於腎素-血管收縮素系統的藥物會傷害發育中的胎兒，甚至導致胎兒死亡（參閱 5.1）</li></ul> |

**1 適應症及用法**  
**1.1 心臟衰竭**  
ENTRESTO® 核准用於治療慢性心臟衰竭（紐約心臟學會 [NYHA] 第二級至第四級）且心室射出率降低的患者，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。  
說明：ENTRESTO® 可以和其他心臟衰竭療法併用，用於取代血管收縮素轉化酶抑制劑（ACEI）或血管收縮素受體阻斷劑（ARB）。

**2 用法用量**  
**2.1 劑量**  
ENTRESTO® 禁止與 ACEI 併用。如欲從原本使用的 ACEI 轉換為 ENTRESTO®，兩種藥物之間須間隔 36 小時的藥物排除期（washout period）[參閱禁忌症 (4) 及藥物交互作用 (7.1)]。  
ENTRESTO® 的建議起始劑量為每日兩次 100 毫克。  
依據患者耐受情況於 2 至 4 週後加倍 ENTRESTO® 劑量，達到每日兩次 200 毫克的目標維持劑量。  
**2.2 未服用 ACEI 或 ARB，或之前使用低劑量前述藥物患者之劑量調整**  
目前未服用 ACEI 或 ARB 的患者，或是之前使用低劑量前述藥物的患者，建議之起始劑量為每日兩次 50 毫克。依據患者耐受情況，每 2 至 4 週加倍 ENTRESTO® 劑量，達到每日兩次 200 毫克的目標維持劑量。  
**2.3 重度腎功能不全患者之劑量調整**  
重度腎功能不全（eGFR < 30 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>）患者之建議起始劑量，為每日兩次 50 毫克。依據患者耐受情況，每 2 至 4 週加倍 ENTRESTO® 劑量，達到每日兩次 200 毫克的目標維持劑量。  
輕度或中度腎功能不全患者，不需要調整起始劑量。  
**2.4 肝功能不全患者之劑量調整**  
中度肝功能不全（Child-Pugh B 級）患者之建議起始劑量，為每日兩次 50 毫克。依據患者耐受情況，每 2 至 4 週加倍 ENTRESTO® 劑量，達到每日兩次 200 毫克的目標維持劑量。  
輕度肝功能不全患者，不需要調整起始劑量。  
不建議重度肝功能不全患者使用此藥物。

**3 劑型及劑量**  
ENTRESTO® 為中央無刻痕的橢圓形膜衣錠，分為下列劑量：
ENTRESTO® 50 毫克（sacubitril 24 毫克及 valsartan 26 毫克）：淺紫色膜衣錠，一面刻印「NVR」字樣，另一面刻印「LZ」字樣。
ENTRESTO® 100 毫克（sacubitril 49 毫克及 valsartan 51 毫克）：淺黃色膜衣錠，一面刻印「NVR」字樣，另一面刻印「L1」字樣。
ENTRESTO® 200 毫克（sacubitril 97 毫克及 valsartan 103 毫克）：淺粉紅色膜衣錠，一面刻印「NVR」字樣，另一面刻印「L11」字樣。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 禁忌症</b><br>ENTRESTO® 禁用於： <ul style="list-style-type: none"><li>對藥品中任何成份過敏的患者。</li> <li>過去使用 ACEI 或 ARB 治療曾有相關血管性水腫病史的患者 [參閱警語及注意事項 (5.2)]。</li> <li>併用 ACEI：禁止在使用 ACEI 的 36 小時內轉換至本藥物，或在使用本藥物的 36 小時內轉換至 ACEI [參閱藥物交互作用 (7.1)]。</li> <li>同時併用 aliskiren 的糖尿病患者 [參閱藥物交互作用 (7.1)]。</li></ul>                                                                                                                                                              |
| <b>5 警語及注意事項</b><br><b>5.1 胎兒毒性</b><br>ENTRESTO® 用於懷孕女性會對胎兒造成傷害。在妊娠第二、三期使用作用於腎素-血管收縮素系統的藥物，會降低胎兒腎功能並增加胎兒及新生兒疾病和死亡率。如果懷孕，請改用其他藥物，並停用 ENTRESTO®，提供適當治療，血管收縮素系統的藥物，沒有其他適當替代藥物，或當本藥可救治母親性命時，請告知懷孕女性本藥物對胎兒的潛在風險 [參閱特定族群使用 (8.1)]。<br><b>5.2 血管性水腫</b><br>ENTRESTO® 可能造成血管性水腫。PARADIGM-HF 試驗的雙盲期內，0.5% 接受 ENTRESTO® 治療的患者及 0.2% 接受 enalapril 治療的患者發生血管性水腫 [參閱不良反應 (6.1)]。若發生血管性水腫，請立即停用 ENTRESTO®，提供適當治療，並監測呼吸道受阻的情形。日後不得再次給予 ENTRESTO®。若確認血管性水腫只有臉部和嘴唇腫脹，此狀況通常不須治療 |

即可排除，但抗組織胺可有效緩解症狀。  
伴隨喉頭水腫的血管性水腫可能會致命。若發生在舌頭、聲門或喉頭，可能導致呼吸道阻塞，應立即給予適當治療，例如皮下注射 1:1000 (0.3 毫升至 0.5 毫升) 的腎上腺素溶液，並採取必要措施以確保患者呼吸道暢通。  
黑人患者使用 ENTRESTO® 後，血管性水腫的發生率高於其他種族患者。  
若患者曾有血管性水腫病史，使用 ENTRESTO® 發生血管性水腫的風險可能較高 [參閱不良反應 (6.1)]。如果患者過去使用 ACEI 或 ARB 治療曾有相關血管性水腫病史，則不得使用 ENTRESTO® [參閱禁忌症 (4)]。

**5.3 低血壓**  
ENTRESTO® 會使血壓下降，也可能造成有症狀的低血壓。腎素-血管收縮素系統活化的患者，例如體液及 / 或鹽分流失（如接受高劑量利尿劑治療）的患者，其風險更高。PARADIGM-HF 試驗的雙盲期內，18% 接受 ENTRESTO® 治療的患者及 12% 接受 enalapril 治療的患者，曾發生低血壓之不良事件 [參閱不良反應 (6.1)]；兩治療組中約有 1.5% 患者曾發生低血壓之嚴重不良事件。使用 ENTRESTO® 前應先矯治體液減少或鹽分流失，或採用較低的起始劑量。如果發生低血壓，應考慮調整利尿劑或併用降血壓藥物的劑量，並治療其他低血壓成因（例如血量不足）。若採取此類措施後低血壓仍持續，應降低 ENTRESTO® 劑量或暫時停用 ENTRESTO®。通常不需要永久停止使用治療。

**5.4 腎功能不全**  
由於 ENTRESTO® 會抑制腎素-血管收縮素-醛固酮系統（RAAS），某些患者接受 ENTRESTO® 治療後，腎功能可能會下降。PARADIGM-HF 試驗的雙盲期內，使用 ENTRESTO® 和 enalapril 的治療組均有 5% 患者發生腎衰竭之不良事件 [參閱不良反應 (6.1)]。若患者依賴腎素-血管收縮素-醛固酮系統活性維持腎功能（例如重度鬱血性心臟衰竭患者），接受 ACEI 和 ARB 治療，會造成尿量減少、漸進性氮血症，極少數會發生急性腎衰竭和死亡。請密切監測血清肌酸酐，若患者發生具臨床意義的腎功能降低，應調降劑量或中斷 ENTRESTO® [參閱特定族群使用 (8.7) 和臨床藥理學 (11.3)]。就像其他影響 RAAS 的藥物，ENTRESTO® 用於雙側或單側腎動脈狹窄患者時，可能會增加血中尿素和血清肌酸酐濃度。應監測腎動脈狹窄患者的腎功能。

**5.5 高血鉀**  
由於藥物作用於 RAAS，因此使用 ENTRESTO® 可能會發生高血鉀。PARADIGM-HF 試驗的雙盲期內，12% 接受 ENTRESTO® 治療的患者及 14% 接受 enalapril 治療的患者，曾發生高血鉀之不良事件 [參閱不良反應 (6.1)]。應定期監測血清鉀離子濃度並適當治療，尤其是對於有重度腎功能不全、糖尿病、低醛固酮症或接受高鉀含量膳食等高血鉀風險因子的患者，必要時須降低劑量或中斷 ENTRESTO® [參閱用法用量 (2.1)]。

**6 不良反應**  
本仿單其他章節另外說明以下具臨床意義之不良反應：

- 血管性水腫 [參閱警語及注意事項 (5.2)]
- 低血壓 [參閱警語及注意事項 (5.3)]
- 腎功能不全 [參閱警語及注意事項 (5.4)]
- 高血鉀 [參閱警語及注意事項 (5.5)]

**6.1 臨床試驗觀察結果**  
由於各項臨床試驗的條件差異很大，一種藥物在臨床試驗中的不良反應發生率，並不能與另一種藥物在臨床試驗中的不良反應發生率直接比較，也未必反映實際的不良反應發生率。PARADIGM-HF 試驗要求受試者在進入隨機分配雙盲期比較 ENTRESTO® 和 enalapril 效果之前，必須持續使用 enalapril 和 ENTRESTO®，分別完成為期 15 天及 29 天（中位數）的導入期。在 enalapril 導入期內，共 1,102 位患者 (10.5%) 永久停止試驗治療，有 5.6% 患者是因為不良事件造成，最常見不良事件為腎功能障礙 (1.7%)、高血鉀 (1.7%) 及低血壓 (1.4%)。在 ENTRESTO® 導入期內，另有 10.4% 患者永久停止試驗治療，有 5.9% 患者是因為不良事件造成，最常見不良事件為腎功能障礙 (1.8%)、低血壓 (1.7%) 及高血鉀 (1.3%)。因為該試驗設計了導入期，以下描述的不良反應發生率實際上低於預期。在雙盲期內進行的安全性評估，共納入 4,203 位接受 ENTRESTO® 治療的患者和 4,229 位接受 enalapril 治療的患者。PARADIGM-HF 試驗中，隨機分配至 ENTRESTO® 的患者，最長接受 4.3 年的治療，用藥持續時間中位數為 24 個月；3,271 位患者接受超過一年的治療。在該試驗雙盲期內，450 位 (10.7%) 接受 ENTRESTO® 治療的患者，和 516 位 (12.2%) 接受 enalapril 治療的患者，因為不良事件而停止治療。  
在雙盲期接受 ENTRESTO® 治療的患者，其發生率 ≥ 5% 的不良反應如表 1 所示。

|             | ENTRESTO®<br>(4,203 人)<br>% | enalapril<br>(4,229 人)<br>% |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 低血壓         | 18                          | 12                          |
| 高血鉀         | 12                          | 14                          |
| 咳嗽          | 9                           | 13                          |
| 暈眩          | 6                           | 5                           |
| 腎衰竭 / 急性腎衰竭 | 5                           | 5                           |

PARADIGM-HF 試驗中，enalapril 和 ENTRESTO® 導入期的血管性水腫發生率均為 0.1%；在雙盲期，接受 ENTRESTO® 治療的患者血管性水腫發生率高於接受 enalapril 治療的患者（分別為 0.5% 和 0.2%）。黑人患者使用 ENTRESTO®。血管水腫發生率為 2.4%，使用 enalapril 血管水腫發生率為 0.5% [參閱警語及注意事項 (5.2)]。在 PARADIGM-HF 試驗雙盲期，相較於接受 enalapril 治療的患者有 1.1% 發生姿勢性低血壓，接受 ENTRESTO® 治療的患者有 2.1% 發生此症。相較於接受 enalapril 治療的患者有 1.3% 發生跌倒，接受 ENTRESTO® 治療的患者有 1.9% 發生此症。  
**實驗室檢驗異常**  
**血紅素及血球容積比**  
在 PARADIGM-HF 試驗雙盲期觀察到，接受 ENTRESTO® 治療和接受 enalapril 治療的患者中，大約各有 5% 患者的血紅素 / 血球容積比降低幅度 >20%。  
**血清肌酸酐**  
在 enalapril 導入期和 ENTRESTO® 導入期，分別有 1.4% 和 2.2% 的患者血清肌酸酐升高幅度 >50%。在雙盲期，接受 ENTRESTO® 治療和接受 enalapril 治療的患者中，大約各有 16% 患者的血清肌酸酐升高幅度 >50%。  
**血清鉀離子**  
在 ENTRESTO® 導入期和 enalapril 導入期，均觀察到約 4% 患者的鉀離子濃度 >5.5 mEq/L。在雙盲期，接受 ENTRESTO® 治療和接受 enalapril 治療的患者中，大約各有 16% 患者的鉀離子濃度 >5.5 mEq/L。

## 600mm


**7 藥物交互作用**  
**7.1 腎素-血管收縮素-醛固酮系統雙重阻斷**  
ENTRESTO® 禁止與 ACEI 併用，以免血管水腫風險升高 [參閱禁忌症 (4)]。  
由於 ENTRESTO® 含有第二型血管收縮素受體阻斷劑 valsartan，故應避免併用 ENTRESTO® 和 ARB。  
糖尿病患者禁止併用 ENTRESTO® 和 aliskiren [參閱禁忌症 (4)]。腎功能不全（eGFR <60 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>）患者應避免併用 aliskiren。  
**7.2 鉀離子保留利尿劑**  
就像其他阻斷第二型血管收縮素或其作用的藥物，併用鉀離子保留利尿劑（例如 spironolactone、triamterene、amiloride）或鉀離子補充劑或含鉀的代鹽可能會導致血鉀增加 [參閱警語及注意事項 (5.5)]。  
**7.3 非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs），包括選擇性環氧合酶抑制劑（COX-2 抑制劑）**  
若患者年長、細胞外液體積減少（包括接受利尿劑治療患者）或腎功能不全，併用 ENTRESTO® 和 NSAIDs（包括 COX-2 抑制劑）可能導致腎功能惡化，可能造成急性腎衰竭。這些作用通常可逆。應定期監測腎功能。  
**7.4 鋰鹽**  
併用鋰鹽及第二型血管收縮素受體拮抗劑，曾造成血清鋰鹽濃度增加和鋰鹽中毒。併用 ENTRESTO® 和鋰鹽時，應監測血清鋰鹽濃度。

**8 特定族群使用**  
**8.1 懷孕**  
**風險摘要**  
ENTRESTO® 用於懷孕女性會對胎兒造成傷害。在妊娠第二、三期使用作用於腎素-血管收縮素系統的藥物，會降低胎兒腎功能並增加胎兒及新生兒疾病和死亡率。大部分流行病學研究僅檢查妊娠第一期使用降血壓藥物導致的胎兒異常，並未區別影響腎素-血管收縮素系統的藥物和其他降血壓藥物的差異。根據動物生殖試驗，在器官形成期間接受 ENTRESTO® 治療會導致大鼠和兔子的胚胎-胎兒死亡率增加，並導致兔子的畸胎。如果懷孕，請改用其他藥物，並停用 ENTRESTO®。然而，如果除了影響腎素-血管收縮素系統的藥物，沒有其他適當替代藥物，或本藥可救治母親性命時，請告知懷孕女性本藥物對胎兒的潛在風險。  
有關特定族群發生重大先天缺陷和流產的預估背景風險尚不清楚。在美國一般族群，臨床確認的懷孕中，發生重大先天缺陷和流產的預估背景風險比例分別為 2-4% 和 15-20%。  
**臨床評估事項**  
**胎兒 / 新生兒不良反應**  
懷孕女性在妊娠第二及三期服用影響腎素-血管收縮素系統的藥物，導致羊水過少，可能造成下列病症：胎兒腎功能降低（導致無尿及腎衰竭）、胎兒肺發育不全、骨骼畸形（包括顱骨發育不全）、低血壓和死亡。  
應進行系列超音波檢查以評估羊膜內的環境。請根據妊娠週齡，適時進行胎兒檢查。然而，患者和醫師應瞭解，直到證實胎兒發生不可逆傷害之前，可能都不會發生羊水過少的現象。若發現羊水過少，須考慮使用其他藥物。若新生兒曾在母體內暴露於 ENTRESTO®，應密切觀察是否發生低血壓、尿量減少及高血鉀。若發生尿量減少或低血壓，應維持其血壓並給予腎臟灌注。患者可能必須換血或透析，以治療低血壓並替腎臟功能。  
**試驗資料**  
**動物試驗資料**  
在器官形成期間給予 ENTRESTO® 治療，大鼠在每日每公斤劑量 ≥ 49 毫克 sacubitril/51 毫克 valsartan 劑量下（根據血漿濃度對時間曲線下面積 [AUC]，相較於每日兩次 200 毫克之人類最大建議劑量 [MRHD]，sacubitril 活性代謝物 LBQ657 為 ≤ 0.14 倍，valsartan 為 1.5 倍），兔子在每日每公斤劑量 ≥ 5 毫克 sacubitril/5 毫克 valsartan 劑量下（依據 valsartan 和 LBQ657 的 AUC，分別為 MRHD 的 4 倍和 0.06 倍）會導致胚胎-胎兒死亡率增加。兔子在 ENTRESTO® 劑量 ≥ 每日每公斤 5 毫克 sacubitril/5 毫克 valsartan 的母體毒性劑量下，會發生少數的胎兒水腫症，顯示 ENTRESTO® 具有致畸胎性。ENTRESTO® 的胚胎-胎兒不良作用，係由血管收縮素受體拮抗作用活性導致。  
以最高達每日每公斤 750 毫克劑量的 sacubitril [依據 LBQ657 的 AUC，為 MRHD 的 4.5 倍]，以及最高達每日每公斤 600 毫克劑量的 valsartan [依據 AUC，為 MRHD 的 0.86 倍] 進行之大鼠產前和產後發育試驗顯示，在器官生成期間、妊娠與哺乳期間，使用 ENTRESTO® 治療可能會影響幼發育和存活。

**8.2 哺乳**  
**風險摘要**  
尚無資料顯示 sacubitril/valsartan 是否會排入人類的乳汁、對接受哺乳嬰兒的影響，或對母乳分泌的作用。但 sacubitril/valsartan 會排入大鼠的乳汁中。由於接受哺乳嬰兒暴露於 sacubitril/valsartan 可能發生嚴重不良反應，不建議在哺乳期間接受 ENTRESTO® 治療。  
**試驗資料**  
泌乳大鼠口服（每公斤 15 毫克 sacubitril/15 毫克 valsartan）以 [<sup>14</sup>C] 標定的 ENTRESTO® 後，可觀察到 LBQ657 排入乳汁中。泌乳大鼠口服（每公斤 3 毫克單劑）以 [<sup>14</sup>C] 標定的 valsartan 後，可觀察到 valsartan 排入乳汁中。  
**8.4 兒童患者使用**  
尚未確立 ENTRESTO® 用於兒童患者的安全性及療效。  
**8.5 老年患者使用**  
相較於整體試驗族群，老年（≥ 65 歲）和極老年（≥ 75 歲）患者的藥物動力學並未觀察到相關差異 [參閱臨床藥理學 (12.3)]。  
**8.6 肝功能不全**  
輕度肝功能不全（Child-Pugh A 級）患者服用 ENTRESTO® 時，不需要調整劑量。中度肝功能不全（Child-Pugh B 級）患者之建議起始劑量為每日兩次 50 毫克。由於未針對重度肝功能不全患者進行過試驗，不建議重度肝功能不全（Child-Pugh C 級）患者使用 ENTRESTO® [參閱用法用量 (2.4)、臨床藥理學 (11.3)]。  
**8.7 腎功能不全**  
輕度（eGFR 介於 60 至 90 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>）至中度（eGFR 介於 30 至 60 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>）腎功能不全患者不須調整劑量。重度腎功能不全（eGFR <30 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>）患者之建議起始劑量為每日兩次 50 毫克 [參閱用法用量 (2.3)、警語及注意事項 (5.4)、臨床藥理學 (11.3)]。

**9 用藥過量**  
ENTRESTO® 在人體用藥過量相關資料有限。曾在健康自願受試者進行調試，給予單劑 ENTRESTO® 583 毫克 sacubitril/617 毫克 valsartan，以及多次給藥 437 毫克 sacubitril/463 毫克 valsartan (14 天)，發現耐受良好。  
由於 ENTRESTO® 有降血壓作用，用藥過量最可能發生的結果是低血壓。應針對症狀進行治療。  
由於 ENTRESTO® 與蛋白質結合率很高，不太可能由血液透析移除。

**10 說明**  
ENTRESTO®（sacubitril/valsartan）是結合中性溶酶（neprilysin）抑制劑與血管收縮素 II 受體阻斷劑的複合體藥品。ENTRESTO® 為 sacubitril 陰離子、valsartan 陰離子、鈉離子及水分子的錯合物，其莫耳比為 1:1.3:2.5。口服後，該錯合物溶離成 sacubitril（之後會代謝為 LBQ657）和 valsartan。錯合物的化學名稱為 octadecasodiumhexakis[4-[(1S, 3R)-1-[(1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl)-4-ethoxy-3-methyl-4-oxobutyl]amino]-4oxobutanoate]hexakis(N-pentanoyl-N-[[2'-[(1H-tetrazol-1-id-5-yl)]1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-L-valinate)—water (1/15)。實驗式為 C<sub>48</sub>H<sub>53</sub>N<sub>8</sub>O<sub>8</sub>Na<sub>8</sub> 2.5 H<sub>2</sub>O。分子量 957.99，下圖為其結構式：



ENTRESTO® 為口服膜衣錠，含 24 毫克 sacubitril 和 26 毫克 valsartan；49 毫克 sacubitril 和 51 毫克 valsartan；或 97 毫克 sacubitril 和 103 毫克 valsartan。藥錠所含的非活性成分為微晶纖維素（microcrystalline cellulose）、低取代羥丙基纖維素（low-substituted hydroxypropylcellulose）、交聯聚維酮（crospovidone）、硬脂酸鎂（magnesium stearate）、滑石粉（talc）和膠狀二氧化矽（colloidal silicon dioxide）。膜衣所含的非活性成分為羥丙甲基纖維素（hypromellose）、二氧化鈦（E 171）（titanium dioxide）、聚乙二醇 4000（Macrogol 4000）、滑石粉（talc）、紅色氧化鐵（E 172）（iron oxide red）、ENTRESTO® 50 毫克及 ENTRESTO® 200 毫克的膜衣含有黑色氧化鐵（E 172）（iron oxide black）。ENTRESTO® 100 毫克的膜衣含有黃色氧化鐵（E 172）（iron oxide yellow）。

**11 臨床藥理學**  
**11.1 作用機轉**  
ENTRESTO® 具有中性溶酶抑制劑（Neprilysin inhibitor）：Sacubitril 及一種血管收縮素受體阻斷劑：valsartan。ENTRESTO® 經由前驅藥物 sacubitril 的活性代謝物 LBQ657 抑制中性溶酶（中性肽鍵內切酶；NEP）；並經由 valsartan 阻斷第二型血管收縮素的第一型（AT<sub>1</sub>）受體。由於 LBQ657 抑制中性溶酶，進而增加中性溶酶應降解的肽狀（例如利鈉尿肽狀）；同時 valsartan 可抑制第二型血管收縮素的作用，因此 ENTRESTO® 對心臟衰竭患者的心血管和腎臟會產生作用。Valsartan 經由選擇性阻斷 AT<sub>1</sub> 受體，抑制第二型血管收縮素的作用，並抑制仰賴第二型血管收縮素的醛固酮釋放。  
**11.2 藥效學**  
針對健康受試者和心臟衰竭患者，曾施用單劑和多劑 ENTRESTO® [以評估藥效學作用，其結果與抑制中性溶酶同時阻斷腎素-血管收縮素系統的效果一致。在一項針對射出分率降低患者（HFrEF），為期 7 天的 valsartan 對照試驗中，相較於 valsartan，施用 ENTRESTO® 導致了利鈉尿作用顯著增加（非持續）、尿液 cGMP 增加，且血漿 MR-proANP 和 NT-proBNP 減少。在一項 21 天的 HFrEF 患者試驗中，使用 ENTRESTO® 使尿液 ANP 和 cGMP 與血漿 cGMP 顯著增加，且血漿 NT-proBNP、醛固酮和內皮素（endothelin-1）減少。血漿腎素活性和血漿腎素濃度增加，也證實 ENTRESTO® 會阻斷 AT<sub>1</sub> 受體。在 PARADIGM-HF 試驗中，相較於 enalapril，ENTRESTO® 降低了血漿 NT-proBNP（非中性溶酶受質），並增加了血漿 BNP（一種中性溶酶受質）及尿液 cGMP。  
QT 延長：在一項評估 QTc 的臨床試驗中（thorough QTc），給予健康男性受試者單劑 194 毫克 sacubitril/206 毫克 valsartan 以及 583 毫克 sacubitril/617 毫克 valsartan 的 ENTRESTO®，不會影響心臟再極化。  
β 澱粉樣蛋白：腦部和腦脊髓液（CSF）中，許多酵素與 β 澱粉樣蛋白（Aβ）的清除有關，中性溶酶是其中之一。給予健康受試者 ENTRESTO® 194 毫克 sacubitril/206 毫克 valsartan，每日一次、為期兩週，結果發現相較於安慰劑，CSF 中的 Aβ<sub>1-38</sub> 增加，而 CSF 中的 Aβ<sub>1-40</sub> 或 CSF 中的 Aβ<sub>1-42</sub> 濃度沒有變化。目前尚不清楚此項結果的臨床意義 [參閱非臨床藥理學 (12)]。  
血壓：高血壓患者在 ENTRESTO® 達到穩定態 (194 毫克 sacubitril/206 毫克 valsartan，每日一次、為期五天）後加入單劑 50 毫克的 sildenafl，相較於僅施用 ENTRESTO®，會額外降低血壓（約 5/4 mmHg，收縮壓 / 舒張壓）。  
併用 ENTRESTO® 並未顯著改變靜脈輸注硝化甘油對血壓的作用。

**11.3 藥物動力學**  
**吸收**  
口服後，ENTRESTO® 溶離成 sacubitril 和 valsartan。Sacubitril 接著代謝為 LBQ657。Sacubitril、LBQ657 和 valsartan 分別在服藥 0.5 小時、2 小時及 1.5 小時後達到最大血漿濃度。估計 sacubitril 的口服絕對生體利用率 ≥ 60%。ENTRESTO® 所含的 valsartan 生體可用率高於其他市售 valsartan 錠劑。ENTRESTO® 內含之 26 毫克、51 毫克及 103 毫克 valsartan 分別相當於其他市售的 40 毫克、80 毫克及 160 毫克 valsartan 錠劑。  
每日給予兩次 ENTRESTO® 後，sacubitril、LBQ657 和 valsartan 會在 3 天內達到穩定態濃度。穩定態下，sacubitril 和 valsartan 不會顯著累積，而 LBQ657 會累積達 1.6 倍。ENTRESTO® 隨餐服用時，對 sacubitril、LBQ657 或 valsartan 的全身暴露量並無具臨床意義的影響。雖然隨餐服用 ENTRESTO® 時，valsartan 的曝藥量降低，但此降幅並未伴隨具臨床意義的療效降低。因此 ENTRESTO® 可隨餐或空腹服用。  
**分佈**  
Sacubitril、LBQ657 和 valsartan 會與血漿蛋白質高質量結合（94% 至 97%）。依據血漿和 CSF 曝藥量的比較，LBQ657 有極少量（0.28%）可穿越血腦屏障。Valsartan 和 sacubitril 的平均擬似分佈體積分別為 75 和 103 L。  
**代謝**  
Sacubitril 可由酯酶容易轉化為 LBQ657；LBQ657 不會進一步顯著代謝。Valsartan 只有少量會代謝；約 20% 的劑量會轉為代謝物形式。曾在血漿中發現低濃度（< 10%）的羥基代謝物。  
**排除**  
口服後，52% 至 68% 的 sacubitril（主要為 LBQ657）和約 13% 的 valsartan 及其代謝物，會由尿液排出；37% 至 48% 的 sacubitril（主要為 LBQ657）和 86% 的 valsartan 及其代謝物會由糞便排出。Sacubitril、LBQ657 和 valsartan 由血漿排除的平均排除半衰期（T1/2），分別約為 1.4 小時、11.5 小時和 9.9 小時。

**線性 / 非線性**  
Sacubitril、LBQ657 和 valsartan 的藥物動力學，在 ENTRESTO® 劑量範圍內（24 毫克 sacubitril/26 毫克 valsartan 至 194 毫克 sacubitril/206 毫克 valsartan）為線性。  
**藥物交互作用**

