


仿單標籤粘貼表

產品名稱	“十全”益爾生錠 1.5公絲	申請廠商	十全實業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字第	025243



【成分】

每錠含：
Dihydroergotoxine
methanesulfonate
.....1.5mg

【適應症】
老人痴呆之輔助治療。

注意：請詳閱說明書後使用



“十全”益爾生錠 1.5公絲
(待赫果信)

Ergoxin Tablets 1.5mg "S.C."
(Dihydroergotoxine methanesulfonate)

十全實業股份有限公司
SHOU CHAN INDUSTRIAL CO., LTD.
南投市南崗工業區仁和路27號

【用法·用量】

本品劑量成人每次一錠
每天三次，服用三、四週後療效更佳。

本藥須由醫師處方使用
衛署藥製字第025243號



十全藥品

衛署藥製字第025243號

“十全”益爾生錠1.5公絲 (待赫果信)

Ergoxin Tablets 1.5mg "S.C." (Dihydroergotoxine methanesulfonate)

本劑主成份 Dihydroergotoxine methanesulfonate 為含有三種麥角生物鹼之雙氫化體變性硫酸鹽，依等量混合之半合成製劑，此三種生物鹼分別為 Dihydroergocornine, Dihydroergocristine 及 Dihydroergocryptine。本品直接作用於血管運動中樞，抑制腦血管的緊張而使血管擴張，阻礙交感神經之興奮及腎上腺素之過度活動，而除去血管的痙攣因子，以防止血管之收縮，因此全盤性的血管擴張，增加末梢血管、腦血管、腎血管之血流量，而改善循環系統，所以本劑對於使腦波正常化，促進腦代謝之氧化，增強腦血流，抑制在神經膠質中，因多醣類滲透壓而造成之腫脹，及增強 Ganqilion Cell 之新陳代謝均有良好的效果，但並不影響正常之血壓機能。

【成份】：Each tablet contains:

Dihydroergotoxine methanesulfonate.....1.5mg。

【適應症】：

老人痴呆之輔助治療。

【用法用量】：

本品劑量成人每次一錠，每天三次，服用三、四週後，療效更佳。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1.禁忌：對本劑有過敏病史患者。

2.慎重投與：高度徐脈患者。

3.副作用：①循環系：徐脈或血壓低下、腦貧血樣症狀、顏面潮紅、頭昏眼花感、心悸亢進之症狀出現。②過敏症：有時有發疹或有搔癢感等過敏症狀出現，此時應中止投與。③精神神經系：有時有頭痛、頭重、眩暈、不眠或睡意麻感等症狀出現。④消化器：有時有噁心、嘔吐、便秘、腹痛食



十全藥品

衛署藥製字第025243號



“十全”益爾生錠 1.5公絲(待赫果信)

Ergoxin Tablets 1.5mg “S.C.”
(Dihydroergotoxine mesylate)

【成分】：Each tablet contains:

Dihydroergotoxine mesylate 1.5mg

【臨床藥理】：

1. Dihydroergotoxine mesylate的作用機轉尚不清楚，可能為在中樞減少血管緊張度及減少心跳並阻斷了週邊 α 接受體，另一可能機轉為影響神經細胞代謝，進而改善了氧氣的攝取，及改善了腦部代謝而使抑制性神經傳導量正常。
2. 藥物動力學：本品口服吸收率約百分之二十五，半小時至一小時半之後達到最高血漿濃度。由於首渡效應所致，生體可用率約在百分之五至十二之間。分佈體積為1100公升，約16公升/公斤，百分之八十一與血漿蛋白結合。它的排除為雙相式， α 相的半衰期較短，為1.5至2.5小時， β 相半衰期較長，為13-15小時。主要經由膽汁排入糞便中。經由尿液排除的量約百分之二，包括原形藥及其代謝產物，原形藥少於百分之一。總廓清率為每分鐘約1800公撮。老年病人的血漿濃度略高於年輕人。由於僅有一部份的藥品及其代謝產物經由腎臟排除，因此肾功能不全的病人通常不需要減少劑量。

【適應症】：老人痴呆之輔助治療。

【用法用量】：本藥須由醫師處方使用。

口服劑：每日服用3至6mg，分次服用，最好在飯前服用。

【注意事項】：

【禁忌】：已知對本藥過敏者。

【注意】：1.在出現嚴重心動過緩時，須注意。必須將 Dihydroergotoxine mesylate置放於孩童拿不到的地方。

2.低血壓、急發性精神疾患服用本品須衡量危險性與效力。

3.過量處理：目前尚無因服用過量而產生嚴重症狀之病例。

【副作用】：偶爾會發生鼻塞、短暫性噁心以及胃部不舒服，但通常在用餐時服用即可避免。大多數病例，不須採行特別的措施，副作用即會自動消失。

【儲存條件】：儲存於30°C以下(最好為15~30°C)密閉容器避光貯存。

【賦形劑】：Lactose, Starch, Magnesium Stearate, Starch Pregelatinized.

【包裝】：10~1000錠塑膠瓶裝與鋁箔盒裝。

十全實業股份有限公司

公司：南投縣南投市仁和路27號

電話：(049)2254221-3

服務專線：(049)2254615

訂購專線：0800-491666

傳真：(049)2254617