

黃氏

9.6毫克/毫升

循克滴劑

(綜合水果)

GIKO DROPS 9.6MG/ML "H.S."

(銀杏葉類黃酮配醣體) (GINKGOFLAVONGLYCOSIDES)

【成份】：每20滴 (=1ml)

含有銀杏葉萃取物 (Ginkgo biloba leaves extract) 40mg，其中含 Ginkgo flavone glycosides 9.6mg (Quercetin, Kaempferol, Isorhamnetin)，Terpene lactones 2.4mg (Ginkgolides 1.24mg, Bilobalide 1.16mg)。

【賦形劑】：

Propylene Glycol、Sucrose、L-Arginine、Sodium Saccharin、Caramel、Citric Acid、Green Tea Ext、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Alcohol 95%、Orange Essence、Lemon Essence、Purified Water。

【適應症】：末梢血行障礙之輔助治療。

【藥理特性及說明】：

本藥品的主成份為銀杏葉萃取物，根據Dr. Willmar Schwabe的研究，Ginkgo flavone glycosides可以清除自由基、微量增加前列腺環素 PGI₂的生理活性，Ginkgolides會跟血小板活化因子PAF競爭與受體結合，拮抗PAF的生理活性，因而可能能夠輔助改善末梢微細血管的血液流變特性和流動速率等，供應充足的血氧和必須的能量物質給組織器官的細胞，幫助組織器官的生理功能得以正常運作。

【用法用量】：醫師藥師藥劑生指示藥品

一次服用20滴 (相當於40mg銀杏葉萃取物)，每天服用三次。

【警語及注意事項】：

1. 因個人體質不同，個別病患服用本藥後之療效反應可能有所差異，無法盡如預期。
2. 使用本藥之前，應先確認相關症狀並非因需要其他更確定治療之潛在疾病所引起。
3. 「手術出血風險」：「如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用」。
4. 「不良反應」：「依據案例報告、臨床研究及上市後資料顯示，使用含銀杏葉抽出物成分 (Ginkgo biloba extract) 之藥品，可能發生以下不良事件，包含器官(如眼睛、鼻子、大腦和胃腸道)出血、頭痛、頭暈、輕微的胃腸道不適(如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐)及過敏性皮膚反應(如紅斑、皮疹、水腫、瘙癢)，嚴重者甚至可能發生過敏性休克」。

【特殊族群】：

「癲癇病人：建議癲癇病人避免使用含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)及已知會降低癲癇發作閾值之藥品。癲癇病人服用銀杏製劑產品，無法排除該品會促使其下一次癲癇的發作。

【禁忌】：

1. 對銀杏葉萃取物過敏的患者。
2. 十二歲以下的孩童。
3. 懷孕。
4. 授乳的婦女欲服用本品時，必須慎重評估其風險，因為到目前為止尚無足夠資料證明本藥品主成份是否會分泌於母乳中。動物試驗沒有顯示對胎兒有影響，但人體之數據仍然欠缺。

【藥品交互作用】：

1. Ginkgo biloba與抗凝血劑(如phenprocoumon或warfarin)或抗血小板藥品(如clopidogrel、acetylsalicylic acid及NSAIDs等)併用可能會影響抗凝血劑或抗血小板藥品之作用。
2. Ginkgo biloba與 warfarin合併使用時，建議應於開始合併使用、改變劑量、停止或更換使用銀杏製劑時，進行凝血功能監測。
3. Ginkgo biloba可能具有抑制P-glycoprotein作用，而因此增加P-gp受質藥品(如dabigatran)之暴露，建議合併ginkgo biloba與P-gp受質藥品時應謹慎使用。

【不良反應】：

1. 少數會有輕微腸胃不適、頭痛或皮膚過敏反應如：紅、腫、癢。有此症狀出現時，應停止使用。
2. 少數個案在長期服用後有出血的情況。
3. 如發生上述任一不良反應時，應立即請教醫師協助釐清是否因為服用本藥品引起或是因其他原因所導致。
4. 目前仍無因服用過量而導致不良反應之報告，但仍請細心觀察，如果發生不屬於上述的不良反應時，亦請通知你的醫師或藥師。

【患者資訊】：

1. 請務必遵照[用法用量]的指示方法服用，否則可能無法達到預期的療效。如有必要，請由醫師指示其他的用法用量。
2. 服用本藥品時請與溫開水一起服用。
3. 一天服用三次，請於每天早上、中午和晚上，於飯前或飯後服用。
4. 如果忘記服用或服用劑量不夠時，請依照[用法用量]的指示方法繼續使用。
5. 如果患者必須手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用。
6. 月經期間請停止服用本藥品。
7. 請放置於陰涼處和孩童無法取得處。

【包裝】：6~4000毫升玻璃瓶裝。

【儲存】：25°C以下儲存。