

“衛達”

好如臨

錠 1.5 公絲

(待赫果信)

Hodrin Tablets 1.5mg "Weidar"
(Dihydroergotoxine mesylate)

GMP G-0135

CODE No. HD-0320



【成分】：每錠含：

Dihydroergotoxine mesylate 1.5mg (A mixture in equal proportions of dihydroergocornine, dihydroergocristine and dihydroergocryptine in form of methane sulfonate.)

賦形劑：Cellulose microcrystalline, Povidone K-30, Lactose, Tartrazine, Brilliant blue FCF, Starch potato dried, Polyvinyl pyrrolidone crosslinked, Stearic acid

【臨床藥理】：

1. **Dihydroergotoxine mesylate** 的作用機轉尚不清楚，可能為在中樞減少血管緊張度及減少心跳並阻斷了週邊 α 接受體，另一可能機轉為影響神經細胞代謝，進而改善了氧氣的攝取，及改善了腦部代謝而使抑制性神經傳導量正常。
2. 藥物動力學：本品口服吸收率約百分之二十五，半小時至一小時半之後達到最高血漿濃度。由於首渡效應所致，生體可用率約在百分之五至十二之間。分佈體積為 1100 公升，約 16 公升／公斤，百分之八十一與血漿蛋白結合。它的排除為雙相式， α 相的半衰期較短，為 1.5 至 2.5 小時， β 相半衰期較長，為 13-15 小時。主要經由膽汁排入糞便中。經由尿液排除的量約百分之二，包括原形藥及其代謝產物，原形藥少於百分之一。總廓清率為每分鐘約 1800 公撮。老年病人的血漿濃度略高於年輕人。由於僅有一部份的藥品及其代謝產物經由腎臟排除，因此腎功能不全的病人通常不需要減少劑量。

【適應症】：

老人痴呆之輔助治療。

【用法用量】：

本藥須由醫師處方使用。

每日服用 3 至 6mg，分次服用，最好在飯前服用。

【注意事項】：

〔禁忌〕：已知對本藥過敏者。

〔注意〕：

1. 在出現嚴重心動過緩時，須注意。必須將 Dihydroergotoxine mesylate 置放於孩童拿不到的地方。
2. 低血壓、急發性精神疾患服用本品須衡量危險性與效力。
3. 過量處理：目前尚無因服用過量而產生嚴重症狀之病例。

【副作用】：

偶爾會發生鼻塞、短暫性噁心以及胃部不舒服，但通常在用餐時服用即可避免。大多數病例，不須採行特別的措施，副作用即會自動消失。

【儲存條件】：儲存於 30°C 以下（最好為 15-30°C）密閉容器避光貯存。

【包裝】：6-1000 錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

衛達藥製字第 031280 號
LT-HD

衛達化學製藥股份有限公司

台中市工業區 23 路 21 號

最後修訂日期：104.10.12