



"國嘉" 和寧錠 0.5毫克(哈泊度)

Hopan Tablets 0.5mg "Kojar" (Haloperidol)

本品係屬Butyrophenone的一種精神安定劑，具抗精神病效果(抗幻覺、抗妄想，自律神經遮斷及錐體外路症狀)之藥理作用。對Phenothiazine系無效的精神分裂病或躁病之興奮狀態等亦能奏效。

【成份】Each Tablet Contains：

Haloperidol.....0.5mg

【賦形劑】

Lactose Powder、Cellulose Microcrystalline、Brilliant Blue FCF Aluminum Lake、Povidone、Magnesium Stearate、Croscarmellose Sodium

【適應症】

躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

- 成人：初劑量每天2-3次，每次0.5-2mg，假如治療效果不彰，而且病人耐受性很好，可視病人的反應而逐漸提高劑量。維持劑量：通常是每天1-15mg。有時每天劑量需要15mg或是更多。可以考慮在短時間內服用更高的劑量，60mg或是更多，但是這種高劑量只適用於健康情況良好的病人。
- 兒童：通常每3公斤體重服0.1mg。初劑量：五歲以上：每天兩次，每次0.5mg。五歲以下：每天兩次，每次0.25mg。維持劑量：必要的話，劑量可以逐漸增加。如果治療失敗的話，則應在一個月以內停藥。
- 年老病患：初劑量：每天2-3次，每次0.5mg。維持劑量：每天2-3次，每次0.5-2mg。年老病患對於好度較為敏感，所以應該小心調整劑量。

【注意事項】

1.禁忌：

- 昏睡狀態的患者及Barbiturates誘導體的中樞神經抑制劑的強力影響下的患者。
- 重症心不全者。
- 帕金森氏病者。

2.慎重投與：

- 肝障害患者。
- 癲癇疾患及有此病歷者。
- 甲狀腺機能亢進患者。
- 對本品過敏患者。

3.孕婦及授乳婦投與：

因會分泌至母乳中，及有催畸型之慮(動物實驗)所以授乳婦，孕婦及可能懷孕之婦人希勿服用。

4.相互作用：

- Barbiturates誘導體及酒精會增強本品作用。
- Epinephrine的作用逆轉、血壓降低，本劑投與中，請勿併用Epinephrine。
- Carbamazepine的併用會減弱本品作用。

5.其他：本品投與中，開車及操作危險機械者須特別小心。

【副作用】

- 1.循環器：血壓下降、心電圖變化(QT間隔延長，T波的變化)。
- 2.Syndrom Malin：強度的筋強硬、嚔下困難、發汗、發熱，應停止用藥，水分補充等適當處理。
- 3.錐體外路症狀：Parkinson症候群(手指振抖、流口水等)。
- 4.消化器：腸管痙攣，有止吐作用，可使其他原因所致之嘔吐不明顯。
- 5.內分泌：女性型乳房、乳汁分泌、月經異常。

【警 語】

- 1.曾有精神病患以Haloperidol治療而發生猝死、QT波延長(QT-Prolongation)及Torsades De Pointes之案例報告，尤其是比仿單建議更高的治療劑量和靜脈注射有較高的風險導致QT波延長和Torsades De Pointes發生。發生QT波延長、Torsades De Pointes之高風險案例可能發生於無潛在危險因子之病患，但具有以下危險因子之病患必須特別注意，包括建議接受治療之前已有QT波延長情形之病患(包括電解質不平衡【特別是低血鉀及低血鎂】、使用已知會引起QT波延長之藥物、心血管疾病、甲狀腺功能低下、QT波延長之家族病史)。倘若Haloperidol以靜脈注射途徑給藥，應監測病患之心電圖，追蹤其QT波及心律不整之情形。
- 2.依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized Controlled Trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective Cohort Study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(Dementia-Related Psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【包 裝】

4-1000粒鋁箔盒、瓶裝。

【儲 存】

室溫避光保存(25°C)。

PIC/S GMP



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號

服務專線：(04)26816197