

解鬱膠囊 20 毫克
Juxac Capsules 20 mg

〔說明〕

Fluoxetine 是一種新的抗憂鬱劑，其化學結構式和藥理作用均不同於傳統的三環抗憂鬱劑，口服後可有效地改善憂鬱患者的症狀。其代謝不受年齡與腎功能的影響，因此老年與腎功能不良之憂鬱患者亦可安全使用。

〔成分〕每粒中含有

Fluoxetine HCl.....22.4 mg.
(eq. to Fluoxetine 20 mg)

〔作用〕

Fluoxetine 是一種選擇性血清促進素 (serotonin) 再吸收 (uptake) 的強力抑制劑。其可抑制中樞神經對血清促進素的再吸收，增加血清促進素在腦受體部位的可用率，進而改善憂鬱患者的症狀。

〔適應症〕

抑鬱症，暴食症、強迫症。

〔用法、用量〕

起始劑量為每天早晨服用20mg，而後可依病情酌加劑量，若每日劑量超過20mg時，則每天改為早、晚各服用一次，每日最高劑量不可超過80mg。

本藥須由醫師處方使用。

〔禁忌〕

1. 對本品有過敏性患者。
2. 與單胺氧化酵素抑制劑(MAOI)併用。曾有報告指出有些患者因併服Fluoxetine與單胺氧化酵素抑制劑，或者剛停止使用Fluoxetine，便開始使用單胺氧化酵素抑制劑，造成了嚴重或致命的反應。因此，Fluoxetine不可與MAOI併用，或者是停用MAOI後，應至少隔14天以上才能開始使用Fluoxetine，由於Fluoxetine及它的主要代謝物半衰期相當長，因此停用Fluoxetine 至少應隔5星期以後，才開始使用MAOI。

〔警語〕

1. 一旦出現發疹或其他不能確定由別種病因引起的過敏現象，則應馬上停藥。
2. 重鬱症(Major depressive disorder, MDD)和其它精神障礙之短期研究，發現小孩、青少年和年輕人服用抗憂鬱劑相較於安慰劑可能增加自殺意念及行為。任何人考慮使用解鬱膠囊或其他抗憂鬱劑於小孩、青少年和青年人時應評估臨床用藥之風險與效益。短期研究對於大於24歲以上之成年人服用抗憂鬱劑並無顯示有增加自殺意念或行為之風險，而對於65歲以上之老年人服用抗憂鬱劑，反而較服用安慰劑降低自殺之風險。憂鬱症或其他精神障礙疾病，本身即有自殺傾向之風險。無論任何年齡層之患者開始服用抗憂鬱劑時，健康照護者應嚴密監視其臨床病徵惡化、自殺意念或

不尋常的行為改變，並隨時與醫師聯絡。

3. 依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神藥物，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神藥物用於治療老年失智症患者(dementia related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

〔注意〕

1. 上市前全世界的臨床試驗中有百分之二的患者發生癲癇(此發生率和其他已上市的抗憂鬱劑相似)，因此有癲癇發作病歷的病人，應謹慎使用本品。
2. 小孩、孕婦、授乳婦女使用本劑的安全性尚未確定，所以，除非確實需要否則勿用。
3. 因為Fluoxetine經肝臟的代謝廣泛，所以，Fluoxetine及其代謝物在肝臟硬化病人的體內廓清率會降低，因此，對於肝硬化的病人，應減低劑量或服用頻率。
4. Fluoxetine可能會干擾判斷、思維或運動神經的技巧，因此建議患者服藥後，應避免開車或操作機器。
5. 服藥期間應嚴密監視患者之憂鬱症情況，以防其發生自殺行為。

〔藥品相互作用〕

1. 病人併服Fluoxetine與鉀、色胺酸(tryptophan)、抗精神藥物或其他抗憂鬱劑時，Fluoxetine會提高這些藥物的血中濃度，因此，Fluoxetine與這些藥物併用時，應注意觀察這些藥物的血中濃度，以免造成不良反應。
2. 由於Fluoxetine會與血漿蛋白緊密結合，因此，Fluoxetine與血漿蛋白結合高之藥物併用時，可能會改變藥物的血中濃度，而造成不良反應。

〔副作用〕

神經系統：焦慮、神經質、失眠、疲勞或無力、震顫、流汗、感覺干擾。

胃腸系統：嘔心、下痢、口乾、厭食、味覺改變。

呼吸道：上呼吸道感染、類似流行病毒感染症狀。

全身系統：衰弱無力。

〔貯存條件〕

請密蓋置於室溫 (15-30 ℃) 下貯存。

〔賦形劑〕

Corn Starch, Colloidal Silicon Dioxide, Dimethicone, Capsule(Gelatin, Titanium Dioxide, Sodium Lauryl Sulfate, Tartrazine, Brilliant Blue FCF, New Coccine, Glycerine, Sunset Yellow FCF)

〔包裝〕

4 ~ 1000 粒，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

衛署藥製字第G-5816號
041338號

委託者：**健喬信元醫藥生技股份有限公司**

303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠：**優良化學製藥股份有限公司**

303新竹縣湖口鄉中興村光復路10號

SLT8200R-02