

拉 舒 內服液劑

Lasus Oral Saline Laxative

衛部藥製字第 058354 號

口服鹽類緩瀉劑

【適應症】緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

【說明】1. 當緩瀉劑使用，可用來緩解偶發性便秘。

2. 當通便清腸劑使用，可用於手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

• 一般在30分鐘至6小時內會產生排便。

• 直接服用時，緩瀉效果溫和，不會造成胃腸不適或刺激，在所屬適用年齡範圍內使用是非常的安全。

【主要成份】Each ml contains

Monobasic Sodium Phosphate 480mg

Dibasic Sodium Phosphate 180mg

【賦形劑】Glycerin, Sodium benzoate, Sodium saccharin, Ginger ale, Lemon flavor, Purified water added to make。

【作用理論】鹽類緩瀉劑能增加水份滯留於小腸，因而促進排便功能。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用

緩瀉劑：• 當作緩瀉劑緩解偶發性便秘，劑量及使用方式如下表：

除非醫師建議，請勿使用過量（見警語）。每次服用不可超過45ml且儘可能多喝水以補充因瀉下所流失的水分。

• 服用量及方式：

年齡（歲）	步驟 1	步驟 2	24 小時最大劑量
成人、12 歲以上	15 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240 ml 冷飲或水	45 ml
10 & 11 歲	15 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240 ml 冷飲或水	15 ml
5 ~ 9 歲	7.5 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝一杯約 240 ml 冷飲或水	7.5 ml
5 歲以下	不可使用	不可使用	不可使用

*24小時內服用量勿超過上表所示劑量

醫療程序前清腸：

- 依醫師指示使用本產品作為清腸劑前，請確定醫師了解您的身體狀況及本產品的警語。服用劑量請以醫師建議劑量為主，並額外多補充清流液體以補充因瀉下所流失的水分——最少240ml。
- 服用劑量：每次清腸使用二次 30ml 或 45ml，兩次劑量服用間隔為10 ~ 12小時。
- 每次服用方式：

年齡（歲）	步驟 1	步驟 2
成人、12 歲以上	30 ~ 45 ml 藥液加入一杯約 240 ml 冷飲或水中，喝下	至少再喝 3 杯約 720 ml 冷飲或水
10 & 11 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5 ~ 9 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5 歲以下	不可使用	不可使用

【警語】

- 24 小時內之服用劑量若超過建議劑量，可能引起傷害。
- 請勿使用於鬱血性心臟衰竭、腎臟疾病或 5 歲以下小孩。
- 懷孕、授乳、限鈉飲食或有任何醫療狀況者，請詢問過醫師後再使用。
- 若您正服用處方或非處方藥品，請先詢問過醫師或藥師後再使用。
- 若您有腹瀉、嘔心、嘔吐、排便習慣改變持續兩星期、已經服用其他瀉劑治療便秘超過一星期，請先詢問過醫師後再使用。
- 若您直腸出血、服藥後 6 小時腸未蠕動或出現脫水現象時，請停止使用並詢問您的醫師。早期脫水症狀包括嘔吐、眩暈或尿量比平常少，這些症狀也許是嚴重問題的徵兆（此時請大量補充水份）。
- 請存放在孩童不易取拿之處。如果過量或意外服用，必須立刻送醫。

【不良反應】

可能引起「電解質失衡」、「急性磷酸鹽腎病 (acute phosphate nephropathy)」、「紅疹」及「搔癢」等不良反應。

【其他資訊】

- 一茶匙（5 ml）含：鈉 556 mg，本產品不含任何糖份。
 - 一般在服用後 30 分鐘至 6 小時會產生排便（視服用劑量不同而不同）。
 - 放入冰箱冷藏可增加口感，但不可冷凍。
- 為安全起見，本品瓶口處均密封包裝，若封口鋁箔破損或不見，請勿使用。

包裝、儲存：100毫升以下塑膠瓶裝，25°C 以下儲存。

委託者：元昊生物科技有限公司

高雄市三民區懷安街 119 號 2 樓 TEL：07-386 3323

製造廠：皇佳化學製藥股份有限公司

高雄市鳥松區松埔路一巷 1 號 TEL：07-731 0537