LNT 1.2
衛署藥製字第036237號PIC/S GMP G-3467
衛部藥廠證字第(AP)0433067號

適用藥害救濟制度

"國嘉" 寧痛膜衣錠10毫克（東莨菪鹼）

Linton F.C. Tablets 10mg "KOJAR" (Hyoscine Butylbromide)

【藥　　理】
本品在內臟壁之副交感神經節，具有特殊作用，因此對胃腸、膽及尿道之平滑肌產生特殊的抗痙攣作用。

【成　　份】
Each F.C. Tablet Contains：
Hyoscine Butylbromide.....10mg

【賦 形 劑】
Calcium Phosphate Dibasic、Cellulose Microcrystalline、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Magnesium Stearate、Croscarmellose Sodium、Glyceryl Monostearate、Magnesium Aluminum Silicate、Methacrylic Acid Copolymer、Talc

【適 應 症】
胃、十二指腸潰瘍、食道痙攣、幽門痙攣、胃炎、腸炎、膽管炎、膽結石、尿路結石、痙攣性月經困難等痙攣性疼痛。

【用法用量】
一次10~20mg(1~2錠)1日3~5次增減。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】
有眼的調節障礙、思眠、眩暈等副作用開車前及從事機械操作的病人切勿投與。

【禁　　忌】
1.綠內障的患者。
2.前列腺肥大造成排尿障礙的患者。
3.重症的心臟病患者。
4.麻痺性。
5.對本品有過敏的病歷者。

【慎重投與】
1.有前列腺肥大的患者。
2.有鬱血性心不全的患者。
3.不整脈的患者。
4.潰瘍性大腸炎的患者。
5.甲狀腺機能高進症的患者。

【副 作 用】
1.噁心、嘔吐、噁寒、皮膚蒼白、低血壓等現象出現時需終止給藥並適當的處理。
2.眼：有時會有調節障礙等現象出現。
3.消化器：口渴有時有腹部膨滿感、鼓腸、便秘等現象出現。
4.泌尿器：有時有排尿障害的現象。
5.精神神經系：有時有頭痛、頭重感。
6.循環系：有時有心悸高進等現象。
7.過敏症：有時有發疹現象發生此時需終止給藥。

【孕婦的投與】
1.妊娠婦投藥的安全性尚未確立。
2.妊娠婦及有懷孕可能的婦人，投藥的安全性及有益性判定尚未對病人有益時不宜投藥。

【小兒的投藥】
小兒投藥的安全性尚未確立。

【相互作用】
1.下列各藥劑會增強本品的作用：
a.三環系抗鬱劑。
b.Phenodiamine劑。
c.Antihistamine劑。
d.Monoamino Acid酵素阻斷劑。

【包　　裝】
6~1000錠瓶、鋁箔盒裝。

【儲　　存】
室溫避光保存(25˚C)。

PIC/S GMP

國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3
臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197