

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“晟德”甘草止咳水	申請廠商	晟德大藥廠股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製 字第 059035 號		

60ml

“晟德”

甘草止咳水

Liquid Brown Mixture “CENTER”

(乾咳化痰劑)

110.11.10

主成分：每毫升(ml)含有

Glycyrrhiza Fluid Extract.....0.12 ml

Opium Tincture.....0.012 ml

Antimony Potassium Tartrate.....0.24 mg

適應症：鎮咳祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用。

成人：每次5毫升，一日3-4次，視病況酌予增減。

注意事項：請詳閱說明書

本品含微量Camphor，請依醫師處方使用。

儲存：(1)本品應置於兒童不及之處。

(2)請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

(3)本品沉澱為自然現象，服前搖勻。

本藥品適用損害救濟制度

衛生署核准仿單號碼059035

LOT: 059035

EXP: 059035

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠

CENTER LABORATORIES INC.

新竹廠湖口鄉實踐路2號

服務電話：(02)2655-9680

4719256001476

每天_____次，每次_____ml

“晟德”
甘草止咳水

LIQUID BROWN MIXTURE “CENTER”

衛署藥製字第 059035 號

主成分：每毫升(ml)含有
Glycyrrhiza Fluid Extract.....0.12ml
Opium Tincture.....0.012ml
Antimony Potassium Tartrate.....0.24mg

適應症：
鎮咳祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
成人：每次5毫升，一日3-4次，視病況酌予增減。

藥理作用：
甘草性溫、順氣化痰，使製劑味感甘甜，阿片酞輕微麻醉作用，能止咳、止痛、止癢、止吐作用，加上酒石酸鎂鉀的祛痰使本劑的乾咳化痰更彰顯著效。

注意事項：

1. 具成癮性，須慎重給藥勿超過建議劑量。
2. 不得併服含酒精飲料。
3. 服後偶有思睡、眩暈現象，應避免開車及操作機械。
4. 發疹、搔癢、過敏時，應即停藥。
5. 本品含微量 Camphor，請依醫師處方使用。

禁忌：

嚴重呼吸抑制的病患禁用、嚴重肝機能障礙、心肌不全的患者、急性酒精中毒患者均禁用。
孕婦及哺乳婦：在相關性的動物試驗報告中指出會產生畸形胎，且曾經由母乳而引起新生兒呼吸抑制，一般不建議給藥，除非醫療上必要。

副作用：

呼吸抑制、不整脈、血壓異常、思睡、不安、眩暈、興奮、發汗、視覺模糊、噁心、嘔吐、便秘等現象產生。

賦形劑：Glycerin, Alcohol, Benzoic Acid, Anise Oil, Camphor, Caramel (Sugar Burnt), Water Purified

包裝：30~4000 毫升塑膠瓶裝；3~400 包(每包 10 毫升)鋁箔袋盒裝。

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。
- (3)本品沉澱為自然現象，服前搖勻。

註

- (1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。
- (2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

110.11.10

“晨德”
(乾咳化痰劑)

甘草止咳水

Liquid Brown Mixture “Center”

街部藥製字第059035號

LOT :
EXP :

晨德大藥廠股份有限公司 新竹廠
CENTER LABORATORIES INC.

10 ml

主成分：每毫升 (ml) 含有

Glycyrrhiza Fluid Extract 0.12 ml

Opium Tincture 0.012 ml

Antimony Potassium Tartrate 0.24 mg

適應症：鎮咳祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用。

成人：每次5毫升，一日3-4次，視病況酌量減增。

注意事項：請詳閱說明書。

微量camphor，請依醫師處方使用。

保存：(1) 本品應置於兒童不及之處。

(2) 請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

(3) 本品勿做為自然現象，服前搖勻。

適用藥害救濟制度

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號
服務電話：(02) 2655-8680

