

“榮民”氧化鎂錠

Magnesium Oxide Tablets 250 毫克 250 mg

衛署藥製字第 013382 號

【成分】

有效成分及含量：

每錠含 Magnesium Oxide 250mg

其他成分(賦形劑)：Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Talc、Lactose Monohydrate Spray Dried、Microcrystalline Cellulose、Silicon Dioxide。

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多；軟便。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一) 3 歲以下。
- (二) 消化道潰瘍的人。
- (三) 有腎臟疾病的人。
- (四) 闌尾(盲腸)發炎或有其症狀的人(服用本藥可能增加胃腸道穿孔或破裂的風險，使病況變得複雜)。
- (五) 胃腸或直腸出血的人。
- (六) 潰瘍性結腸炎、慢性腹瀉(服用本藥可能會增加腹瀉)、憩室炎的人。
- (七) 有結腸或迴腸造口的人。
- (八) 有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。
- (九) 高分泌失常，如：十二指腸潰瘍、Zollinger-Ellison Syndrome、多發性內分泌腺瘤和全身性著色性蕁麻疹的病人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二) 併用其他瀉劑或與其他藥品併用時 [如：Cimetidine、Dicumarol、Digoxin、Isoniazid、Levodopa、Phenothiazines (尤其是 Chlorpromazine)、Calcifediol、Calcitriol、Potassium Phosphate、Sodium Phosphate、Chlordiazepoxide、Diazepam、Sodium Polystyrene Sulfonate Resin (SPSR)、Tetracycline]。

(三) 連續使用一星期以上。

(四) 對於牛奶或乳製品耐受度低者。

四、其他使用上注意事項：

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (五) 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。
- (六) 本藥單位劑量之酸中和能力為 12.3 mEq。
- (七) 本藥單位劑量之鎂含量為 12.4 mEq。

(八) 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。

(九) 本藥使用期間可能有腹瀉產生。

(十) 長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。

(十一) 雖有報告指出孕婦長期高劑量使用本藥會使新生兒產生伴隨嗜睡、肌肉張力降低、心臟血管和呼吸功能不全之高鎂血症，但於懷孕中期和後期只要避免長期高劑量，一般認為仍可安全使用。

(十二) 如果在規律服藥中忘記服藥，且發現時尚未超過兩次服藥時間的中點，則可以補服一次劑量；若已接近下次服藥時間，或發現時已超過兩次服藥時間的中點，則不必補服，照下次服藥時間用藥即可，且下次服藥時不可服用加倍劑量。

(十三) 飯後 1~3 小時和睡前服用本藥(尤其是潰瘍病人)可使藥物發揮最大的治療效果。

(十四) 服用本藥期間建議限制鈉的攝取量。

【用法、用量】

年齡	制酸劑	瀉劑
成人及 12 歲以上	每次 1 錠，一天 3~4 次，或需要時服用，應嚼碎後吞服。	一日 1~3 次，1 次 1~2 錠，一日以 3 次為限。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人使用量之 1/2。	適用成人使用量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人使用量之 1/4。	適用成人使用量之 1/4。
未滿 3 歲	請洽醫師診治。	請洽醫師診治。
瀉劑：服用間隔須 4 小時以上，於飯前(或隨餐)服用。		

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉、噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
其他	1. 發疹等過敏症狀。 2. 暈眩、頭昏眼花、心跳不規則、心情或精神改變、異常疲倦或虛弱(可能為高鎂血症或其他電解質不平衡)。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀，請立即停止使用，並接受醫師診治。

- (一) 若有任何不適情況發生。
- (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。
- (三) 使用一星期後無效。
- (四) 腹瀉持續不止或更嚴重。
- (五) 有血便及自發性腸道出血狀況。

【包裝】 6~1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【藥理作用】

一、制酸劑－本藥並不直接影響胃酸的分泌，而是藉化學性的酸鹼中和反應，緩衝過多的胃酸，進而緩解胃酸過多的症狀。

- 二、本藥口服後，約只有 10 % 鎂(Magnesium)會被腸道吸收。
- 三、本藥由腎及糞便排泄，約 15~30%所形成的鹽類會被腸道吸收並由腎臟排泄。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【保存條件】本品應包裝於緊密容器，貯於 25℃以下乾燥處所。



榮民製藥股份有限公司

Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.

447 Chung Shan E. Rd., Sec. 3, Chung-Li Dist., Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.
桃園市中壢區中山東路三段 447 號 電話：(03)4651190

