

敏羅黴素膠囊100毫克 (美諾四環素)

MERO CAPSULE 100MG (MINOCYCLINE)

衛署藥製字 第 036940 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-11-06

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Minocycline(as hydrochloride).....100mg (力價)

1.2 賦形劑

Lactose、Magnesium Stearate

膠囊殼: Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、
Erythrosine、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF、Purified Water

1.3 劑型

膠囊劑。

1.4 藥品外觀

白色至微黃色粉末顆粒混合物充填於#2之藍頭、橙身硬膠囊中，頭、身各印有黑色“G-3852”。

2 適應症

具感受性革蘭氏陰性及陽性菌，立克次氏體，巨型濾過性病毒所引起之感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

1. 常用劑量：

成人：開始時200mg，然後每12小時100mg。

8歲以上小孩：開始時4mg/kg，然後每12小時2mg/kg。

2. 非併發之淋病感染(不包含尿道炎和直腸肛門感染)：

開始時200mg，然後每12小時100mg，至少持續4天，並於治療後2~3天內要做培養檢驗。

3. 非併發淋病之男性尿道感染：

每12小時100mg，持續5天。

4 禁忌

1. 對四環素過敏之患者，禁用本品。

2. 孕婦、嬰兒和孩童應避免使用本品，因四環素類製品具胎兒毒害，且會造成發育期牙

齒的永久變色(變成黃棕色)。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

1. 本品會減緩口服避孕藥的效果。
2. 本品會抑制血漿凝血酵素(Prothrombin)活性。故與抗凝血劑合併治療時，應降低調整抗凝血劑劑量。
3. 本品屬制菌性藥物，應避免與殺菌性藥品如Penicillin合用。
4. 本品的吸收會受制酸劑等包括鋁、鈣、鎂、鐵等成份之干擾破壞。
5. 本品會由乳汁泌出，故哺乳婦女是否得用本品，應視此藥對哺乳婦女的重要性而權衡。

7 交互作用

目前尚無資訊

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

曾經發現的臨床副作用有：胃腸不適現象的發生，皮膚的光過敏反應，與劑量相關的腎毒害(BUN增高)，過敏反應，血液毒害。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

本品乃為抑制細菌蛋白質合成的抑菌性抗生素。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性


目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝



4-1000粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

請保存於乾燥陰涼處 (儲存於 25°C 以下)。

製造廠

政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號

藥商

健喬信元醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉工業一路 6 號