

# 永康緒膜衣錠

## MOCALM F.C. TABLET

衛署藥製字 第 046759 號

須由醫師處方使用

版本日期 2026-05-05

### 1 性狀

#### 1.1 有效成分及含量

Each F.C. tablet contains :

Flupentixol dihydrochloride.....0.58 mg

(eq. to Flupentixol..... 0.5 mg)

Melitracen hydrochloride..... 11.25 mg

(eq.to Melitracen.....10.0 mg)

#### 1.2 賦形劑

Lactose Monohydrate, Fine Powder、Sodium Starch Glycolate, Type A、Povidone, K-30、Sodium Stearyl Fumarate、Talc、Magnesium Stearate、Opadry II Pink 85F240077、Opaglos 2 Clear(97W19196)

#### 1.3 劑型

膜衣錠

#### 1.4 藥品外觀

粉紅色圓形膜衣錠，一面為S，另一面無。

### 2 適應症

焦慮症、憂鬱症。

### 3 用法及用量

#### 3.1 用法用量

成人：通常劑量為每日2粒，早晨和中午各服1粒。如嚴重病例，早晨的劑量可增到2粒。

老年病人：每日早晨1粒。

維持劑量：普通每天早晨1粒，如有嚴重不安和失眠，可另加服鎮靜劑。

### 4 禁忌

配伍禁忌：未知

### 5 警語及注意事項

#### 5.1 警語/注意事項

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

重鬱症(Major depressive disorder, MDD)和其他精神障礙之短期研究，發現小孩、青少年和年輕人服用抗憂鬱劑相較於安慰劑可能增加自殺意念及行為。任何人考慮使用本產品或其他抗憂鬱劑於小孩、青少年和青年人時應評估臨床用藥之風險與效益。短期研究對於大於24歲以上之成年人服用抗憂鬱劑並無顯示有增加自殺意念或行為之風險，而對於65歲以上之老年人服用抗憂鬱劑，反而較服用安慰劑降低自殺之風險。憂鬱症或其他精神障礙疾病，本身即有自殺傾向之風險。無論任何年齡層之患者開始服用抗憂鬱劑時，健康照護者應嚴密監視其臨床病徵惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，並隨時與醫師聯絡。

### 5.5 其他注意事項

曾有服用鎮定劑之病患應漸進停藥。

## 6 特殊族群注意事項

### 6.1 懷孕

不可使用於孕婦。

### 6.2 哺乳

不可使用於授乳婦。

## 7 交互作用

### 藥物交互作用

本品可加強下列藥物作用：alcohol、barbiturates、中樞神經抑制劑。如與MAO抑制劑併用，可能引起高血壓危象。如與guanethidine或相同作用的藥物併用，會降低高血壓治療效果。同時使用thymoleptics會加強下列藥物作用：adrenaline、noradrenaline。

## 8 副作用/不良反應

### 8.1 臨床重要副作用/不良反應

在推薦劑量下，極少發生副作用，可能會有短暫性焦躁不安與失眠現象發生。

## 9 過量

過量症狀：主要以Melitracen引起的 anticholinergic症狀出現，較少出現Flupentixol引起的錐體外徑症候。

治療方式：症狀與支持療法，應儘速洗胃，可以投與活性炭，治療目的在於保持呼吸道與心血管系統的暢通。Epinephrine(Adrenaline)不能使用於此種病患。可用diazepam治療痙攣。可用biperiden治療錐體外徑症候。

## 10 藥理特性

## 10.1 作用機轉

本品含有兩種已充分了解和確切證明的化合物。

Flupentixol是一種神經安定劑，於小劑量時，本身具有抗抑鬱解焦慮作用。

Melitracen是一種兩極性精神安定劑，於低劑量時，有精神賦活作用。

(兩種藥物複合後，便具有抗抑鬱、解焦慮及致活精神等性質。)

## 10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

## 10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

## 11 藥物動力學特性

(依文獻記載)

口服4小時後可達最高血漿濃度，Flupentixol半衰期約35小時，Melitracen半衰期約19小時，複方製劑並不會影響單一成份的藥物動力性質。

## 12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

## 13 包裝及儲存

### 13.1 包裝

4-1000粒塑膠瓶裝、PVDC鋁箔盒裝、Al-Al鋁箔盒裝。

### 13.2 效期

如外包裝所示。

### 13.3 儲存條件

25°C以下儲存。

## 製造廠

瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路182號

## 藥商

瑞士藥廠股份有限公司

台南市新市區中山路182號

SWISS PHARMACEUTICAL CO.,  
LTD.