



"永勝"

拿痛長效持續性藥錠750毫克

Naton-S.R. Tablets 750mg "EVEREST"

本品主成分Naproxen為非類固醇消炎劑，屬於芳香乙酸類衍生物，其化學式為(-) Sodium 2-(6-Methoxy-2-Naphthyl) Propionate，為一種很有效的全身性消炎劑。實驗證明其鎮痛作用與消炎作用為同類製劑之數倍。可解除輕度及中度之疼痛和風濕性關節炎症狀，而且由於本品具有長效治療之優點，一日只需服用一次，避免服藥上之不便，並維持穩定的血中濃度，故為相當優異的消炎鎮痛製劑。

【成份】：每錠含

Naproxen..... 750mg

【特徵】：

1. 本品之抗風濕效果強，且副作用較Aspirin, Indomethacin, Phenyl Butazone低。
2. 本品和新的非類固醇消炎藥物如Ibuprofen, Ketoprofen等比較，其藥效最高且副作用低。
3. 本品之胃腸道吸收快，因此對急性突發性關節炎尤具療效，能迅速發揮鎮痛消炎效果。
4. 改善功能活動性—能改善風溼病人之生活，如晨間僵臥、抓握強度、走路、爬樓梯時間、傾仰角、並減輕痛楚。
5. 本品為無蓄積性、無成癮性、無幻覺性的消炎鎮痛劑。
6. 作用持久—本品為長效控釋劑型，一日只需服用一次即可達到治療所需藥效，避免服藥上之不便。

【臨床藥理】：依文獻記載

本品口服吸收完全，平均體內半衰期約14小時，Naproxen與血漿蛋白之結合率高，且大部份由尿中排出，本品不會誘導新陳代謝酵素，能抑制前列腺素合成酶。由於本處方之設計，可以在經過胃腸道時與胃腸液形成明膠狀層，以控制有效成分慢慢釋放出來，所以與一般市售品比較，藥物的最高血中濃度有同質化的減低及延緩，達成穩定的有效血中濃度。食物並不影響本製劑的生體可用率，由於Naproxen抑制前列腺素合成導致子宮收縮無力，故懷孕末期服用本劑可能與長期分娩及難產有關。

【適應症】：

急性風濕關節炎、骨關節炎、粘連性脊椎炎、關節周圍炎，上腕肩甲骨炎及骨骼肌不適之粘液囊炎，腱鞘炎之消炎、鎮痛、解熱。

【用法用量】：

每日服用1錠，須整錠吞服不可咬碎，以免造成過量或無效，5歲以下的小孩安全性尚未評估，請勿服用本品。

本藥須由醫師處方使用。

【副作用】：

以下副作用是以非長效控釋性的Naproxen錠劑給有風濕性關節炎及骨關節炎病人服用後的臨床觀察報告，本劑屬長效控釋錠劑，有些副作用，可能在本劑是不會發生的。

1. 腸胃道—胃灼熱、噁心、食慾不振、腹痛、便秘、下痢、嘔吐、黑便、腸胃出血最罕見。
2. 中樞神經系—頭痛、嗜眠、眩暈、眼花、頭昏、意志不能集中、抑鬱。
3. 皮膚症狀—搔癢、皮膚疹、流汗、瘀斑、紅疹、蕁麻疹、紫斑。
4. 心臟血管系—水腫、心悸、呼吸困難。
5. 感覺異常—耳鳴、視力模糊、重聽。

6. 口渴約1/100的機會，其他罕見者：血管神經性水腫、血小板減少症、黃疸等。

【注意事項】：

1. 本劑不可同時服用Naproxen sodium，因為它們均會形成Naproxen陰離子於血漿中循環。
2. 胃腸易受刺激或有消化性潰瘍及憩室病歷之病人，必須注意服用後的癥狀。
3. 初期血紅素值在10克或以下之病人，若接受長期治療時必須監測血紅素值。
4. 和蛋白質有親和力，而可能取代其他藥物與蛋白質之固著而導致藥物的交互作用，理論上製劑本身同樣地也會被取代，故當病患服用Bishydroxycoumarin或Warfarin(抗凝血藥物)，再服用本劑會更延長血凝時間，服用Hydantoin(抗癲癇藥物)，Sulfanamide(磺胺藥)，Sulfonylurea(降血糖藥物)，或Methotrexate(抗腫瘤藥)等皆須防止藥物中毒及病情惡化。
5. 本劑會減少血小板之凝聚和延長血凝時間，作凝血試驗時須注意，其消炎鎮痛解熱效用可能隱蔽受感染的癥兆，使用前詳察受感染之情形。
6. 在某些病人有末梢水腫之報導，故有高血壓、心臟不全，體液滯留之患者，必須小心使用本劑。
7. 病人服用本劑可能增加尿中第17位置酮化類固醇(17-Ketogenic Steroids)的量，做定量分析時，該藥物或其代謝物與間—雙硝基苯(m-Dinitrobenzene)有交互作用。雖然第17位羥基皮質酮類(17-Hydroxycorticosteroid)的測定(Porter-Silber Test)並不被影響，最好做腎上腺功能試驗前三天(72小時)暫時停用本劑。
8. 使用於老年人：研究顯示雖然血漿濃度不變，但未結合的血漿分率有增加，可建議在需要高劑量及必須調節劑量時注意。
9. 使用於肝功能不全之病人：慢性酒精中毒、肝病和其他肝硬化，降低了本劑的血漿濃度但未結合的藥物血漿分率增加，即意味授予本劑劑量無法得知，尤其是高劑量授予時。
10. 使用於腎功能不健全之病人：本劑使用於有明顯腎功能不全之病人，必須特別小心，並且必須監測血清肌氨酸酐或肌氨酸酐的清除。若低於20ml/min可能是本劑代謝物的蓄積所引起。
11. 特別注意事項：採用本劑治療期間，若配合的類固醇劑量被降低或去除，應注意將類固醇劑量慢慢地降低，且病人必須仔細觀察是否有副作用之證據，其中包括腎上腺不全及風濕性關節炎的加重症狀等。

【服藥過量】：

萬一病人不小心或故意服用大量時，必須確認在胃中是否完整錠，在動物實驗中顯示，迅速服用活性炭(0.5g/kg體重)將可明顯地降低藥物的吸收。臨床實驗服用過量會有嘔吐、消化不良、腹部疼痛。由於本劑是屬長效控釋錠，故其在服用消化後將持續吸收超過16小時以上。

【賦形劑】：

Methocel K15M、Food Yellow NO.5(Aluminum-lake)、Magnesium Stearate、Corn Starch。

【包裝】：

2~1000錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

【貯存】：

避光貯存25℃以下。

衛署藥製字第043823號



永勝藥品工業股份有限公司
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)