

"元宙"暢循脈錠10毫克

Nigoline Tablets 10mg (Nicergoline)

衛署藥製字第 033825 號
本藥須由醫師處方使用

組成

每一錠含 Nicergoline 10 毫克。

劑型

糖衣錠。

臨床特性

適應症

末梢血管循環障礙。

用法用量

每天三次，每次 5-10 毫克。為了促進吸收，應在兩餐之間服用。

本藥劑量、給藥之期間及投與途徑，取決於臨床之病況嚴重程度。在某些特定情況之下，建議一開始即以注射方式給藥，再以口服給藥維持治療劑量。

在治療一段時間後，而非剛開始治療時，可能會觀察到一些主觀或客觀的效果。

禁忌症

禁用於對 Nicergoline 或其他賦形劑過敏者。

特殊警語及注意事項

一般而言，在建議的治療劑量下，適脈旺不會影響動脈血壓；對高血壓患者會造成壓力逐漸減低之影響。

當病人有高尿酸血症或曾有痛風之歷史和/或正在使用可能會影響尿酸代謝排除之藥物時，應小心使用。

因曾有報告指出，少數的病人在注射給藥後會產生低血壓之現象，因此在以注射方式給藥後的幾分鐘內，病人應保持於休息狀態，尤其是在給藥之初期。

纖維化(例如：肺部、心臟、心瓣膜與腹膜後位)與使用某些具有血清素 5HT_{2β} 受體促效作用的參角鹼類有關。

報告發現，使用某些參角鹼或其衍生物，可能產生參角中毒的症狀(包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛與周邊血管收縮)。醫師處方此類藥物前，應瞭解參角過量的徵象與症狀。

請放置於兒童無法取得之處

藥物及其他交互作用

Nicergoline 會增強抗高血壓藥物之作用。

懷孕及哺乳

雖然毒性試驗報告未指出 Nicergoline 具致畸胎作用，但在懷孕期間，只有在必要情況下才可以投與本藥。

對駕車及操作儀器之影響

適脈旺並不會對開車或是儀器操作造成影響。

不預期反應

少數例子中發現，本品偶有產生輕微副作用。這些副作用通常與血管作用有關，如：低血壓和眩暈、消化道不適、熱潮紅、皮膚搔癢、嗜睡、失眠。

過量

尚未有藥物過量的案例。

藥理學特性

藥效藥劑學特性

藥物治療的分類：週邊血管舒張劑，ATC C04AE02。

已發現 Nicergoline 會促進腦部新陳代謝-血液動力的狀態。

Nicergoline 具有抗血小板凝集的特性。具出血的傾向。

藥物動力學特性

當口服給與時，Nicergoline 會被快速的吸收。排除，代謝物主要由尿液排出，糞便為次要的排出途徑。

臨床前安全性資料

各式動物毒性試驗已顯示 Nicergoline 提供很好的耐受性(口服致死劑量：小鼠 726 毫克/公斤，大鼠 2872 毫克/公斤。)

而且 Nicergoline 無胚胎毒性或致畸胎作用。

保存方法

儲存 25°C 以下乾燥處。

包裝

4-1000 錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

製造廠：元宙化學製藥股份有限公司。

廠址：南投縣南投市南崗工業區南崗三路 272 號

