

"優生" 平躁錠

Pinsaun Tablets "Y.S."

(衛署藥製字第 003291 號)

LT-098-PI

【主要成分】：每粒含量：

Amitriptyline Hydrochloride..... 25mg

【適應症】：

憂鬱病。

【警語】：

重鬱症 (Major depressive disorder, MDD) 和其他精神障礙之短期研究，發現小孩、青少年和年輕人服用抗憂鬱劑相較於安慰劑可能增加自殺意念及行為。任何人考慮使用"優生"平躁錠或其他抗憂鬱劑於小孩、青少年和青年人時應評估臨床用藥之風險與效益。短期研究對於大於24歲以上之成年人服用抗憂鬱劑並無顯示有增加自殺意念或行為之風險，而對於65歲以上之老年人服用抗憂鬱劑，反而較服用安慰劑降低自殺之風險。憂鬱症或其他精神障礙疾病，本身即有自殺傾向之風險。無論任何年齡層之患者開始服用抗憂鬱劑時，健康照護者應嚴密監視其臨床病徵惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，並隨時與醫師聯絡。

【警語】：依行政院衛生署97.08.18.
衛署藥字第0970329829號公告刊載

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT) 臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【注意事項】：

①禁忌：

- (a)青光眼患者（服用 Anticholinergics 之患者）
- (b)三環系抗抑鬱藥物過敏之患者。
- (c)心肌梗塞恢復期之患者。

②慎重投與：

- (a)排尿困難，眼內壓上升（服用 Anticholinergics 之 side effect）
- (b)心功能不全，心肌梗塞、狹心症、不整脈（idiopathic tachycardia）及甲狀腺機能亢進者。
- (c)癲癇之痙攣性疾病。

- (d) 抑鬱病人有自殺傾向者。
- (e) 腦障害所引起之精神分裂症。
- (f) 小兒及高齡。

③副作用：

- (a) 循環系：血壓上升或下降，心律不整，心悸、心阻斷、心發作。
- (b) 精神神經系：tremor、運動失調、四肢知覺異常、譫妄、不眠、焦躁。
- (c) 抗膽鹼作用：口渴、排尿困難、眼內壓上昇、視覺調節障害、便秘。
- (d) 過敏症：面部、舌之浮腫、發疹、蕁麻疹。
- (e) 血液：Agranulocytosis, WBC ↓。
- (f) 肝臟：黃疸、GOT ↑、GPT ↑。
- (g) 消化器：食慾不振、噁心、嘔吐、便秘、腹部脹滿，腸內容物滯留。
- (h) 內分泌系：低鈉血症、低滲透壓血症、尿中排鈉尿增加、高張尿、意識障害並伴隨抗利尿激素分泌不正常症（SIADH）。
- (i) 長期投與：口周部之不隨意運動。

④交相作用：

- (a) MAO inhibitor 併用一發汗、不穩、全身痙攣、異常高熱、昏睡宜避光。
- (b) Ethanol 之投取，加強本劑作用。
- (c) 其他慎重投與之藥物：Anticholinergics、Epinephrines、CNS depressants (Barbiturates)。
- (d) 降壓劑之作用減弱。

⑤孕婦投與：三環系抗抑鬱藥物，經動物實驗有催畸形作用。

⑥其他：思睡、注意力、反射能力低下。

【用法用量】：

通常成人一次一錠，一天三次，嚴重狀況時可增至一次2錠，一天三次。
本藥須由醫師處方使用。

【包裝】：

瓶裝：100's. 200's. 500's. 1000's.



優生製藥廠股份有限公司

台中市工業區工業21路14號

MM 200905