

攝利寧 膜衣錠

Polenin F.C. Tablets

成份： 每錠含有
Cernitin T-60.....60 毫克
Cernitin GBX.....3 毫克

藥理作用： 作用機轉未明，只有動物試驗顯示本品具有抗發炎以及解除充血之作用，細菌學試驗於平滑肌有緩解細胞增生及舒緩痙攣的效果。本品缺少人體試驗之藥理作用之報告。

適應症： 初期前列腺肥大症狀，例如：頻尿、夜尿、殘尿感、尿流細小。

用法用量： 每天 3 次，每次 2 錠。請整粒吞服並佐以液體一起服用。
本品之效果是逐漸的，可能需要 3 個月時間才能達到完全之效果，應持續本品以維持效果。本品不適用於幼童、青少年、以及婦女。

藥物動力學： 本品尚無藥物動力學之相關資料。

臨床前的安全性資料： 安全性的藥理研究以及毒性研究資料顯示本品對人類無特別之安全顧慮，亦未顯示可能導致基因突變性。

禁忌： 對本品之任何成分有過敏者請勿服用。

注意事項：

1. 服用本品以前，應先就診醫師，以免錯失發現可能潛在的疾病，例如：攝護腺癌或膀胱癌。
2. 若症狀惡化或是持續超過 1 個月未改善症狀，應該就醫再評估。
3. 對攝護癌特殊抗原 (PSA) 以及攝護腺癌檢測之影響
臨床試驗中發現服用本品可能輕微減低血中的攝護癌特殊抗原 (PSA) 濃度，這可能造成攝護癌特殊抗原檢測值的改變。

藥物交互作用： 未曾研究本品與其他藥物之交互作用。

懷孕及哺乳之婦女： 本品不適用於女性，也未曾研究對男性之生殖力之影響。

對開車以及操作機械能力的影響： 本品不會影響開車或操作機械之能力。

副作用： 很少數的報告出現副作用，如：噁心、腹瀉和過敏，如皮膚紅疹。

過量： 未有用藥過量之報告。

賦形劑： Microcrystalline Cellulose 、 Colloidal Silicon Dioxide 、 Magnesium Stearate 、 Maltodextrin 、 Dibasic Calcium Phosphate 、 Hydroxypropyl Methylcellulose 、 Quinoline Yellow 。

儲存： *於 25℃ 以下陰涼乾燥處儲存。並置放於兒童不易取得處。
*緊閉容器，避光儲存。保存品質，不要任意改變原始包裝及避免混合。

包裝： 12-1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 049111 號 GMP G-9857

醫師藥師藥劑生指示藥品

藥商： 寶齡富錦生技股份有限公司

地址： 台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製造廠： 寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址： 桃園市平鎮區興隆路 266 號

DP457A01IN01