



必克風膠囊

P.P.C. CAPSULES

衛署藥製字 第 026289 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-11-25

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Acetaminophen.....120 mg
Ethoxybenzamide.....300 mg
Dexchlorpheniramine Maleate.....1.17 mg
Caffeine Anhydrous.....50 mg

1.2 賦形劑

Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose、Pregelatinized Starch、
Magnesium Stearate
膠囊殼：Brilliant Blue FCF、Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Titanium
Dioxide

1.3 劑型

膠囊劑

1.4 藥品外觀

蓋與身為淺綠色之#0硬膠囊，內裝白色粉末。

2 適應症

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)。

3 用法及用量

3.1 用法用量


通常成人(15歲以上)每次1粒，8歲~14歲每次1/2粒，一日服用3次，於飯後30分鐘以內服用之。

4 禁忌

苯酮尿症(Phenylketonuria)患者不得服用本劑。

5 警語及注意事項

- 國內外曾有2歲下幼兒使用第一代抗組織胺口服劑型藥品後導致嚴重傷害(如中樞神經功能障礙等)之案例報告。目前並無明確證據顯示兒童使用第一代抗組織胺藥品之效益，本品應謹慎使用於6歲以下兒童族群。
- 「懷孕 30 週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥 (NSAIDs)可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。懷孕 20 週或以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥 (NSAIDs)可能導致



胎兒腎臟功能不全 (fetal renal dysfunction)、羊水過少 (oligohydramnios)，甚至新生兒腎臟損傷 (renal impairment)。若醫療專業人員認為病人有必要於孕期 20 至 30 週時使用非類固醇抗發炎藥，則應限制以最低有效劑量及最短期間治療。若治療時間超過 48 小時，醫療專業人員應考慮使用超音波監測羊水狀態。」

5.1 警語/注意事項


1. 服用後若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加快、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 須置於小孩接觸不到之處。
3. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。除非藥師、藥劑生或醫師指示，服用本劑時不得併服其他藥品。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
7. 不要服用本劑超過七天。
8. 服用本劑後，如果症狀沒有改善或症狀還併隨有發燒或發燒持續三天，應停藥立即就醫。
9. 服用本劑後，如果喉嚨疼痛持續二天以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
10. 肝毒性：
 - i. 使用acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen 成分之藥品。
 - ii. 過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
 - iii. 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen 或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
11. 服用本劑時請勿再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心悸過速。
12. 不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

5.3 操作機械能力

服用本劑後，駕車或操作危險器械時要小心。

6 特殊族群注意事項

除非藥師、藥劑生或醫師指示，青光眼、肺氣腫、呼吸急促或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用本劑。



除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得服用。

吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本劑。

6.1 懷孕

除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

「抑制前列腺素合成可能會影響懷孕和/或胚胎/胎兒發育。部分流行病學研究數據顯示，在懷孕早期使用前列腺素合成酶抑制劑會提高流產、心臟畸形之風險。動物實驗已證實使用前列腺素合成酶抑制劑會導致著床前/後胚胎損失率及胚胎/胎兒致死率增加；此外，曾有動物實驗報告指出，於器官形成期使用前列腺素合成酶抑制劑之動物，其胚胎畸形 (包括心血管畸形) 之發生率增加。

6.2 哺乳

除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

6.4 小兒

除非藥師、藥劑生或醫師指示，12歲以下不得使用。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

1. Acetaminophen：偶有過敏反應，在建議劑量下使用少有副作用發生，長期服用超大劑量會引起肝毒性，在兒童急性中毒劑量小於150mg/kg。

2. Dexchlorpheniramine Maleate：嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加速。

3. Caffeine：神經質、興奮、睡不著與心搏加快。

4. 嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens -Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

8.3 上市後經驗

過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

9 過量

1. 服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

2. 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專



家。

3. Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48 ~ 72小時才明顯可見。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

6 ~ 1,000粒鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

本藥應儲存於25°C以下乾燥之緊密容器，避光貯存。

製造廠

強生化學製藥廠股份有限公司

新北市三重區三和路四段77號2、3樓、79號1至6樓

藥商

強生化學製藥廠股份有限公司

新北市三重區三和路四段77號2、3樓、79號1至6樓