

# “培力” 普羅鈣錠 667公絲 (醋酸鈣) Procal Tablets 667mg "P.L." (Calcium Acetate)

衛署藥製字第036794號G-3772

【成份】 Each tablet contains:

Calcium Acetate.....667mg eq to calcium 169mg

【本質】 本品為醋酸鈣鹽，每錠中含有相當於169mg的鈣，對於帶有中等度腎功能不足的病人，將會呈現磷酸鹽儲留及某種程度的高磷酸鹽血症(Hyperphosphatemia)由於磷酸鹽的儲留將導致二次性的副甲狀腺亢進引起骨質萎縮和軟組織鈣化。

因此治療上仍直接針對於高磷酸血症的處理。治療上控制高磷酸血的手段有：

- (1) 減少食物上的攝取磷酸鹽。
- (2) 抑制小腸中吸收磷酸鹽。
- (3) 經由有效的透析法從體中分離磷酸鹽。

事實上減少食物的攝取及經由透析法的抑制磷酸鹽速率不足，透析的病人吸收食物中的磷酸鹽約有40-80%，因此對於大部份腎衰竭的病人在維持作透析時正常必要使用口服磷酸鹽結合劑才能控制高磷酸鹽血症。

口服藥劑型的醋酸鈣錠劑在人體饑餓狀態下有40%劑量被吸收（有食物時則吸收量為30%）。此醋酸鈣錠在中性溶液下有很高的溶解度例如在小腸中即可提供有效鈣去結合磷酸鹽變成沉澱性的磷酸鈣，由此即可達到抑制磷酸鹽在小腸中被吸收的情況，可有效控制身體中不再有游離基的磷酸鹽被吸收因而有效的控制高磷酸鹽血症。

【適應症】 腎衰竭末期的高磷酸鹽血症。

【用法用量】 首次用於透析中的成人為每餐二錠，大部份透析中病人需要用到每餐3-4錠，直到病人血中磷酸鹽值低於6mg/dl為止，部份病人使用本品會有Hypercalcemia 出現而須降低Calciferol or Vit. D之Dose，本品須在餐前或餐中服用。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項及禁忌】

- (一) 病人患有高鈣血鹽症為禁忌。
- (二) 腎衰竭病人若給予鈣鹽食物有可能形成高鈣血症若給予醋酸鈣錠服用，則不可再服用其他含鈣食品，慢性高鈣血鹽症將導致血管鈣化及軟組織鈣化。
- (三) 服用醋酸鈣錠將誘發高鈣血鹽症，服用本品應從低劑量開始，並作每星期二之的血鈣(Serum calcium)檢查。
- (四) 服用毛地黃(Digitalis)病人不可服用本品以免引起心律不整(Cardiac arrhythmias)。
- (五) 醋酸鈣錠將影響四環素生體可用率。
- (六) 長期使用本品並無致癌及影響受精情況。
- (七) 對於妊娠婦女並無安全的資料使用時要慎重。
- (八) 小兒科方面的使用並無安全的資料。
- (九) 副作用：(1) 臨床上使用本劑病人有些有噁心現象。  
(2) 本品的使用會引起高鈣鹽血症。

【包裝】 12-1000 錠瓶裝，盒裝。

Code No.:PAT 667



**培力藥品工業股份有限公司**

中華民國·台中市工業區六路十一號·台灣省

電話：(04) 23592576 (代表號)

FAX：(04) 23590992