

“生達” 保胃懸乳液

SCRAT SUSPENSION "STANDARD"

衛署藥製字 第 043945 號

須由醫師處方使用

版本日期 2026-02-23

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每ml含 Sucralfate 100 mg

1.2 賦形劑

Crospovidone Micronized、Titanium Dioxide、Sorbitol 70% Non-Crystallising Solution、Sodium Phosphate Monobasic、Methylparaben、Alginate Sodium、Xanthan Gum、Glycerin、Silicon Resin Emulsion、Yogurt、Alcohol 95%、Purified Water

1.3 劑型

懸浮液

1.4 藥品外觀

白色～灰白色懸浮液

2 適應症

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道潰瘍、逆流性食道炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

每天四次，每次 10 ml（或一包），空腹時使用（飯前半小時服用）。
本藥須由醫師處方使用。

4 禁忌

（依文獻記載）

目前尚無資訊

5 警語及注意事項

（依文獻記載）

5.1 警語/注意事項

－ 使用時注意事項：

（1）服用時儘可能在空腹時進行，大約於進餐前半小時服用。

（2）本品之功能是在強酸下方能達到最佳療效，因此若欲與制酸劑或減少胃酸分

泌之藥物（如：H₂-組織胺接受器拮抗劑）併用，則二者服用的時間至少要隔開30～60分鐘之久。

(3) 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症 (Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變 (Dialysis encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。

7 交互作用

(依文獻記載)

目前尚無資訊

8 副作用/不良反應

(依文獻記載)

8.1 臨床重要副作用/不良反應

胃腸偶而出現便秘的現象（於2599例治療病患中，僅發現有2.2%之便秘）。

9 過量

(依文獻記載)

目前尚無資訊


10 藥理特性


(依文獻記載)

10.1 作用機轉

“生達”保胃懸乳液所含的主成分Sucralfate就化學性質而言，是一種蔗糖八硫酸鹼性鋁鹽 (Basic Aluminum Salt of Sucrose Octasulfate)。

- Sucralfate為蔗糖八硫酸鹼性鋁鹽





從實驗數據上得知，Sucralfate之所以能治療潰瘍，是由於此劑具細胞保護的作用。當口服時，於胃內的強酸下，Sucralfate會變為帶有多個陰離子且具高度黏著性的物質。而在潰瘍區域的黏膜由於細胞質滲出物及細胞碎片的堆積，造成有豐富蛋白質的區域。Sucralfate的多個陰離子為負電，而集中於潰瘍區域的蛋白質為正電，故在Sucralfate與潰瘍區之間形成多價鍵結。此即為Sucralfate之所以有選擇性與潰瘍區域作用的機轉。除此之外，並可形成一層具黏著性的保護膜包於潰瘍傷口處，而可保護細胞障壁。

10.2 藥效藥理特性

(1) Sucralfate於強酸下能高度選擇性地吸附在破損的胃腸黏膜上，形成一種潰瘍保護層。

- a. 抗滲透性之保護層：阻止胃酸及胃蛋白酶滲入潰瘍黏膜區之刺激作用。
- b. 抗消化性之保護層：保護新黏膜細胞避免被胃蛋白酶分解。
- c. 抗崩解性之保護層：抵抗膽汁、酒精、阿斯匹林或其他抗發炎藥劑之崩解新黏膜細胞。

(2) Sucralfate是一種非全身性的藥物，口服後幾乎有95%的藥物仍留於胃腸道，所以在胃腸道僅少量被吸收。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊

11 藥物動力學特性

(依文獻記載)

目前尚無資訊

12 臨床試驗資料

(依文獻記載)

目前尚無資訊

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4000ml 以下塑膠瓶裝、鋁箔袋盒裝、膠箔袋盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

25°C以下儲存。

製造廠

生達化學製藥股份有限公司二廠 台南市新營區開元路 1 5 4 號

藥商

生達化學製藥股份有限公司二廠 台南市新營區開元路 1 5 4 號