

過敏性止咳劑

“晟德”

息咳寧糖漿

Secorine Syrup "Center"

衛署藥製字第 040833 號

主 成 份：本品每公撮(ml)含有

dl-Methylephedrine Hydrochloride.....	1.0 mg
Chlorpheniramine Maleate.....	0.1 mg
Guaifenesin.....	5.0 mg

藥理作用：

1. dl-Methylephedrine Hydrochloride(鹽酸甲基麻黃鹼)：對氣管炎及支氣管炎有止咳解痙等支氣管擴張作用，亦能解除充血性支氣管炎，且無一般麻黃鹼所引起如心悸、出汗、興奮、脈搏加速及失眠等副作用。
2. Chlorpheniramine Maleate(氯菲安明縮蘋果酸)：為具抗過敏作用之抗組織胺劑，吸收快、作用迅速且副作用極低。
3. Guaifenesin(呱芬那辛)：是療效卓著的祛痰劑，可使呼吸道濃稠的黏液減低表面張力，吸收水份、潤滑氣管、去除黏膜刺激，使濃痰變稀薄而易於咳出，並且可以減少咳嗽次數，故本劑有助於氣管炎、感冒及咽喉炎等引起咳嗽之喀痰。

適 應 症：

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喀痰)

用法用量：醫師藥師藥劑生指示用藥。

成人：一日服3～4次，每次10ml。

6～12歲：一日服3～4次，每次5ml。

3～6歲：一日服3～4次，每次2.5ml。

注意事項：

1. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用，且服用本藥時不得併服其他藥品。
2. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
3. 不得併服含酒精之飲料。

警 語：

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 3歲以下孩童，請依照醫師、藥師、藥劑生指示服用。
3. 對藥物過敏者不得使用。
4. 若咳嗽持續一星期以上，或有發燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
5. 氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用此藥。
6. 不要過量服用，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
7. 不要服用本藥超過七天。
8. 服用本藥後，如果症狀沒有改善或併有發燒持續三日，應停藥立即就醫。
9. 服用本藥後喉嚨疼痛持續兩日以上，並併有發燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
10. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，開車或操作重機械應小心，不要飲用酒精飲料，亦不可服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
11. 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本劑：青光眼、肺氣腫、呼吸急促或呼吸困難、或因前列腺腫大引起之排尿困難等。
12. 本藥含有支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。

包 裝：60~4000ml 瓶裝

貯 存：

- (1) 本品應置於兒童不易之處。
- (2) 請密封儲存於室溫，避免陽光直射。

製 造 廠：

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠
CENTER LABORATORIES INC.
廠 址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路2號
公司電話：(02)2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562
工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820