

“生達”舒可樂 錠 200毫克 (氯美查諾)

Solacon Tablets 200mg "Standard"
(Chlorzoxazone)

本品係一種肌肉鬆弛劑，對於骨骼肌的僵緊具有緩解作用。

主 成 分：每錠含

Chlorzoxazone.....200mg

藥理作用：本品對骨骼肌痙攣有關之脊髓多相神經反射回路產生作用，進而遮斷其神經傳導，為一種中樞性肌肉鬆弛劑。且在不影響正常肌肉機能的條件下達到異常緊張之緩解。

特 點：1. 可緩解肌肉緊張，增加其運動性。
2. 作用迅速，服用30～60分鐘，即有明顯肌肉弛緩作用，藥效可持續約6小時。
3. 無蓄積性，習慣性等副作用。
4. 對正常肌肉機能無影響。

適 應 症：腰背痛症，頸肩腕症候群，肩關節周圍炎，筋炎，腱炎，脊椎炎，神經痛。

用法用量：成人1次1錠，1日3～4次，飯後及就寢前服用。
本藥須由醫師處方使用。

禁 忌 症：1. 對此藥無法忍受的患者。
2. 已對本劑有過敏之患者。
3. 肝、腎障害患者。

警 告：1. 服用此藥再和酒精或其他中樞神經系統的抑制劑併用可能會產生加成的作用。
2. 孕婦的使用：顧慮到胎兒發育的過程中，可能產生不利的影響，因孕婦服用Chlorzoxazone的安全性尚未建立。故當分娩的婦女必須服用此藥時，醫師需判斷使用此藥後的獲益，遠比它可能發生的危險性為大。

注意事項：對於服用此藥曾經發生過敏性反應的患者，使用上必須留意。服藥期間有過敏反應存在，例如蕁麻疹、皮膚癢或生紅斑點，則必須停止服用。如有觀察到對肝機能不好的現象或症狀時亦必須停止服用。

副 作 用：偶而會有胃腸障礙，極少數的例子會有胃腸出血，嗜睡，暈眩，頭昏眼花，抑鬱或過分興奮，皮膚潮紅，瘀斑，血管神經病性水腫或過敏性反應。發生搔癢或蕁麻疹時，請停止服用。
偶而少數人會產生胸悶，噁心，嘔吐，腹部不快感，便秘，下痢等胃腸障害及眩暈、愛睏等現象。

包 裝：6～1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

衛署藥製字第025402號 Code No. TS-05 2211720



cGMP 藥廠 · ISO 9001

生達化學製藥股份有限公司二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台灣省台南縣新營市開元路154號

受委託盒裝分包裝廠：

生達化學製藥股份有限公司(一廠) 台灣省台南縣新營市土庫里六號之二十