

150.00 mm

130.00 mm

檸檬口味“晟德”舒痰液
Soltan Liquid
(Ambroxol HCl)

3毫克/毫升(鹽酸安布索)

3mg/ml "Center"

GMP
衛署藥製字第 043160 號
G-6790

主 成 份：每毫升(ml)含有
Ambroxol Hydrochloride.....3.0mg

適 應 症：祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
用量：12歲以上：每次10毫升，每日服用3次。
治療12歲以下兒童，請依照下列劑量：
6-12歲：每次5毫升，每日3次。
2-6歲：每次2.5毫升，每日2~3次。
2歲以下幼兒：每次2.5毫升，每日2次。

藥理作用：
Ambroxol Hydrochloride可提高肺部界面活性劑的產生及增加纖毛運動，用以改善黏液的流動與排除。
Ambroxol Hydrochloride藉由纖毛運動增加，使患者將痰液容易咳出而達祛痰之效果，並可使咳嗽緩解。

注意事項：

- 1.對主成分過敏者禁用。
- 2.與抗生素併用時，會提高抗生素在肺部組織的濃度。
- 3.孕婦服用本品時仍須注意慣例應注意事項，懷孕前期(3個月)用藥，更應謹慎觀察。
- 4.有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑(erythema multiforme)、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(Stevens-Johnson syndrome<SJS>/toxic epidermal necrolysis<TEN>、急性廣泛性發疹性膿疱症(acute generalized exanthematous pustulosis<AGEP>)等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含ambroxol或bromhexine成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀(如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛)。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

警 語：

本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

副作用：

- 1.輕微的上消化道副作用，(胃灼熱、消化不良、偶爾噁心、嘔吐)。
- 2.免疫系統疾患：
罕見：過敏反應(hypersensitivity reactions)。
頻率未知：過敏性反應(anaphylactic reactions)(包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症)
- 3.皮膚及皮下組織疾患：
罕見：皮疹、蕁麻疹。
頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症)

賦形劑：Benzoic Acid, Methylparaben, Hydrochloric Acid, Aspartame, Sucralose, Tartrazine, Brilliant Blue FCF, Glycerin, Sodium Metabisulfite, Lemon Essence, Water Purified

包裝：15~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-027 20170420

14S100-E01