

"元宙" 腹消樂 糖衣錠
Talex Sugar Coated Tablets "Y.C."
衛署藥製字第G-9406 048436號

【成份】：Each Sugar Coated Tablet contains:

每錠含Pancreatin 212.5 mg(相當於Amylase 6500 units、Lipase 8000units、Protease 450 units(依據F.I.P.))Metoclopramide Hydrochloride 5 mg。

【說明】：本品可解除由胃腸運動及胰外分泌活性發生障礙引起的胃腸症狀，如；腹漲感、噯氣、噁心及胃部的緊張和壓迫感，Metoclopramide hydrochloride可正常化胃及小腸的運動且可促進胃的排空，Pancreatin則可替代或補充胰酶的不足，促進食物的利用和吸收。

【適應症】：消化器機能異常(噁心、嘔吐及腹部膨滿感)。

【用法用量】：一天三次，每次一到二錠，餐時服用。

【類別】：本藥須由醫師處方使用。

【副作用】：個別的情形一發生在小孩的較為顯著—Metoclopramide可能引起運動困難的症狀(錐體外效應，如頭、頸和肩等部位肌肉的痙攣、動眼危象)如有這種情形必須停止Talex的治療，靜脈注射Caffeine或biperiden(Akineton)可以迅速的除去痙攣，如停止治療，痙攣在數小時內即消失，鎮靜劑如diazepam(Valium)亦可使用，在較高的劑量下偶而有輕微的嗜眠及煩躁不安、溢乳現象。

【禁忌症】：由於可能引起動運不能的症狀，Talex在給予14歲以下的小孩，特別是年紀較輕的小孩，必須有嚴格的指示。

【與其他藥物的作用】：

Talex不能與神經方面藥物一起使用，因其容易導致錐體外症狀的發生。解痙藥也可能減低Paspertin的效果。

【包裝】：6-1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

【儲存】：25°C 以下儲存。



元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO.,LTD

南投市南崗工業區南崗三路二七二號
TEL: (049) 2253190