

“瑞士”



鹽酸四環黴素 膠囊

250毫克
500毫克

Tetracycline HCl Capsules “SWISS”

250mg
500mg

四環素係氯四環素，或經四環素經化學還元作用後將其分子結構上所帶的氯或經旁鏈除掉，因而使該類抗生素能令腸胃引起不適的副作用，得以減去，尤有甚者本劑對體內肝臟可能引起的潛伏性損害，亦因而去除，而對殺菌抑菌的效果絲毫不減，故為安全廣效的抗生素製劑。

【成分】

鹽酸四環黴素膠囊250毫克

Each capsule contains:

Tetracycline Hydrochloride.....250mg(potency)

鹽酸四環黴素膠囊500毫克

Each capsule contains:

Tetracycline Hydrochloride.....500mg(potency)

【賦形劑】

鹽酸四環黴素膠囊250毫克

Lactose、Magnesium Stearate、Primojel

鹽酸四環黴素膠囊500毫克

Lactose、Magnesium Stearate、Primojel、

Sodium Lauryl Sulfate

【膠囊成份】

鹽酸四環黴素膠囊250毫克

Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl

鹽酸四環黴素膠囊500毫克

Sulfate、Tartrazine、Brilliant Blue FCF

鹽酸四環黴素膠囊500毫克

Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl

Sulfate、Brilliant Blue FCF、Tartrazine

【適應症】

革蘭氏陽性，陰性菌，立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

【作用】

本品對於下列各種微生物引起的感染症均有效：

立克次氏體：洛磯山斑疹、斑疹傷寒、Q-fever，立克次氏體疹、壁蟲熱等。
Mycoplasma肺炎(P.PLO,Eaton agent)，引起回歸熱的螺旋菌體。

革蘭氏陰性菌：巴斯德氏菌屬(Pasturella)，桿菌形(Bartonella bacilliformis)，
大腸桿菌，產氣性桿菌屬，志賀氏菌屬，嗜血性感冒桿菌，
克雷氏菌屬等。

革蘭氏陽性菌：鏈球菌屬(包括引起上呼吸道感染之甲類 β -鏈球菌及 α -
鏈球菌及糞便鏈球菌)，肺炎雙球菌，黃色葡萄球菌。

奈瑟氏淋菌，螺旋體屬(引起梅毒及雅司等)，李司忒氏菌屬，梭菌屬，炭疽
桿菌屬，齒梭狀菌屬，放線菌屬。

對於急性小腸阿米巴症，亦可用四環素類抗生素輔助治療之，嚴重之座瘡亦
可用以治療，又對於砂眼之治療則有獨到之處，其他如結膜炎，可用四環素
口服治療或口服與局部製劑併用治療。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人：一日總劑量通常為1gm，分做2次或4次服用。

兒童：每公斤體重每日服用20-50mg分做4次服用。

待症狀消除後，尚需連服1-3天，以避免引起復發的可能。

【注意事項】

(A)本抗生素用作口服或注射時可能導致嚴重之肝臟或腎臟變壞，大量注射
時常能導致死亡，尤以作為孕婦之感染治療時為然，故在使用本劑前及使用
期間內應作肝腎機能及血尿素氮之檢查(Blood Urea Nitrogen
determination)在發現對肝腎有副作用發生時，當即停止使用或予適當
治療，則常可恢復正常。

(B)如患者腎臟機能有障礙時，僅以口服或非口服常用劑量，即可導致藥物體
內蓄積量超過及可能發生肝臟中毒，在此狀況下，應使用比正常量為少之
劑量，如治療須延長時，應注意測定血清中四環素濃度。

(C)發現有過敏現象時應即停止使用。

(D)治療期間同時觀察有否促成抗生素通有之無感受性菌之生長(尤以白色念
珠菌之感染)，如發現則酌量服用或借他法防止之。

【儲存條件】請儲存於25℃以下。

【包裝】

鹽酸四環黴素膠囊250毫克

8-1000顆盒裝、瓶裝。

鹽酸四環黴素膠囊500毫克

4-1000顆瓶罐裝、盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新市廠:台南市新市區中山路182號