

“優良”優復捷黴素 膠囊 250 毫克 (西華定)
U-SAVE CAPULES 250 Mg (Cephadrine)

衛署藥製字第 029599 號

“優良”優復捷黴素 膠囊 500 毫克 (西華定)
U-SAVE CAPULES 500 Mg “U-Liang” (Cephadrine)

衛署藥製字第 037390 號

“優良”優復捷黴素膠囊 U-SAVE Capsules 的主成分 Cephadrine 是一種半合成的頭芽孢菌屬(Cephalosporin)抗生素，化學式為 7 - [D - 2 - Amino - 2 - (1,4 - cyclohexadien - 1 - yl) acetamido] - 3 - methyl - 8 - oxo - 5 - thia - 1 - azabicyclo - [4.2.0] oct - 2 - ene - 2 - carboxylic acid.

臨床藥理：

“優良”優復捷黴素在酸中很穩定，空腹時口服吸收迅速。但飯後腸胃道內的食物會影響藥物吸收的速度，藥量的吸收卻不受限制。按照統計給予一些健康情形良好的志願受試者 250mg, 500mg, 1000mg 的口服劑量，一小時內可測得他們的平均最高血清濃度，分別為 9mcg/ml, 16.5mcg/ml, 24.2mcg/ml。而六小時內有 90% 以上的藥物從尿中以原型式排出，最高尿中濃度各為 1600mcg/ml, 3200mcg/ml, 4000mcg/ml。

成分：

每膠囊內含 Cephadrine 250 mg(Potency)。
500

作用：

實驗顯示，頭芽孢菌屬抗生素能抑制細菌細胞壁的合成，發揮殺菌作用。其殺菌範圍如下：

A 族乙種溶血性鏈球菌 (Group A beta - hemolytic streptococci)

葡萄球菌 (Staphylococci) 包括凝固酶陽性 (Coagulase-positive), 凝固酶陰性 (Coagulase-negative) 及產生青黴素酶的菌株 (Penicillinase-producing strains)

肺炎鏈球菌 (Streptococcus pneumoniae)，就是從前所說的肺炎雙球菌 (Diplococcus pneumoniae)

大腸桿菌 (Escherichia. coli)

奇異變形桿菌 (Proteus mirabilis)

克雷白氏菌屬 (Klebsiella species)

流行性感感冒嗜血桿菌 (Hemophilis influenzae)

適應症：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

“優良”優復捷黴素用以治療以上感受性細菌所引起的下列諸感染症：扁桃腺炎 (tonsillitis)，咽炎 (pharyngitis)，葉性肺炎 (lobar pneumoniae)，鼻咽炎 (nasopharynx)，中耳炎 (otitis media)，皮膚及軟組織感染，生殖泌尿道感染。

用法用量：

飯前飯後都可服用，但必須連續服用二至三天以上。

成人 — 一般劑量為每六小時 250mg，或每十二小時 500mg，嚴重感染可加倍，但最高以每六小時 1Gm 為限。

兒童 — 九個月以上，每日每公斤體重劑量為 25 ~ 50mg，分次服用。每六小時或十二小時服用一次，嚴重感染可加倍，但每日最高劑量為 4Gm。

腎功能不健全的患者，成人初始劑量為 750mg，維持劑量為 500mg，但服藥間隔期間係根據個人尿中縮水肌氨酸肅清力而定(如下表)：

縮水肌氨酸肅清力(ml/min/1.73M ²)	服藥間隔期間(小時)
>20	6-12
15-19	12-24
10-14	24-40
5-9	40-50
<5	50-70

本藥須由醫師處方使用。

禁忌：

對頭芽孢菌屬抗生素過敏反應的患者，不宜使用本劑。

警語：

對 Penicillin 過敏的患者，使用本劑須特別小心。因為臨床和實驗顯示，Penicillin 和 Cephalosporin 有部份交互過敏反應。

副作用：

- 腸胃道：偶會有舌炎、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、胃灼熱感等。
- 皮膚過敏：輕度的風疹、搔癢、關節痛。

3. 血液：暫時性的嗜伊紅性白血球增多，白血球減少及嗜中性白血球減少。
4. 肝：SGOT，SGPT，膽紅素偶會輕微增高，但對肝細胞沒有影響。
5. 腎：有些患者 BUN 有暫時升高的現象，特別是五十歲以上的患者，但成人作血清肌氨酸測定，發現其 BUN 並不隨著血清肌氨酸升高。
6. 偶而會有眩暈、胸壓迫感及念珠菌陰道炎。

注意事項：

1. 特異體質的患者要慎用本劑，若有過敏現象，則須停藥，並用加壓胺，抗組織胺或皮質類固醇處理。
2. 腎功能不健全的患者，使用本劑要特別小心。
3. 本劑服用後會積蓄在血清和組織中，因此，腎功能不健全的患者，治療前和治療期間要作臨床觀察。
4. 長期服用抗生素會導致體內非感受性細菌的繁增，因此，治療期間若發生在感染，要採取適當措施。
5. 孕婦和哺乳婦：實驗上，給予白鼠和兔子四倍於人體的劑量，並未造成畸胎或不孕，但孕婦和哺乳婦使用本劑的安全性尚未確定。

包裝：

8~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

賦形劑：

“優良” 優復捷黴素膠囊 250 毫克：Primojel, Magnesium Stearate, Talc, Silicone Dioxide, Lactose, Capsule (Gelatin, Glycerol, Sodium Lauryl Sulfate, New Coccin, Titanium Dioxide, Sunset Yellow FCF, Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide)

“優良” 優復捷黴素膠囊 500 毫克：Silicone Dioxide, Primojel, Talc, Magnesium Stearate, Lactose, Capsule (Gelatin, Glycerol, Sodium Lauryl Sulfate, New Coccin, Sunset Yellow FCF, Titanium Dioxide)



委託廠：

優良化學製藥股份有限公司
新竹縣湖口鄉光復路 10 號

製造廠：

瑞士藥廠股份有限公司新市廠
台南市新市區中山路 182 號

各成分	(ng/mL)	(ng hr/mL)	(hr)
主成分	26.8±9.2	143.9±57.1	2.2±0.5
杂质	28.7±7.6	134.3±59.0	2.0±0.0
总杂质			10.4±4.6

項目	單位	數值
1. 血清膽固醇	mg/dl	170
2. 血清三酰甘油	mg/dl	100
3. 血清低密度脂蛋白	mg/dl	100
4. 血清高密度脂蛋白	mg/dl	50
5. 血清總脂蛋白	mg/dl	200
6. 血清尿酸	mg/dl	4.0
7. 血清肌酐	mg/dl	1.0
8. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
9. 血清白蛋白	g/dl	4.0
10. 血清球蛋白	g/dl	3.0
11. 血清總蛋白	g/dl	7.0
12. 血清鈣	mg/dl	10.0
13. 血清磷	mg/dl	4.0
14. 血清鉀	mg/dl	4.0
15. 血清鈉	mg/dl	140.0
16. 血清氯	mg/dl	100.0
17. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
18. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
19. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
20. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
21. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
22. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
23. 血清尿酸	mg/dl	4.0
24. 血清肌酐	mg/dl	1.0
25. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
26. 血清白蛋白	g/dl	4.0
27. 血清球蛋白	g/dl	3.0
28. 血清總蛋白	g/dl	7.0
29. 血清鈣	mg/dl	10.0
30. 血清磷	mg/dl	4.0
31. 血清鉀	mg/dl	4.0
32. 血清鈉	mg/dl	140.0
33. 血清氯	mg/dl	100.0
34. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
35. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
36. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
37. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
38. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
39. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
40. 血清尿酸	mg/dl	4.0
41. 血清肌酐	mg/dl	1.0
42. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
43. 血清白蛋白	g/dl	4.0
44. 血清球蛋白	g/dl	3.0
45. 血清總蛋白	g/dl	7.0
46. 血清鈣	mg/dl	10.0
47. 血清磷	mg/dl	4.0
48. 血清鉀	mg/dl	4.0
49. 血清鈉	mg/dl	140.0
50. 血清氯	mg/dl	100.0
51. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
52. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
53. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
54. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
55. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
56. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
57. 血清尿酸	mg/dl	4.0
58. 血清肌酐	mg/dl	1.0
59. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
60. 血清白蛋白	g/dl	4.0
61. 血清球蛋白	g/dl	3.0
62. 血清總蛋白	g/dl	7.0
63. 血清鈣	mg/dl	10.0
64. 血清磷	mg/dl	4.0
65. 血清鉀	mg/dl	4.0
66. 血清鈉	mg/dl	140.0
67. 血清氯	mg/dl	100.0
68. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
69. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
70. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
71. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
72. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
73. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
74. 血清尿酸	mg/dl	4.0
75. 血清肌酐	mg/dl	1.0
76. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
77. 血清白蛋白	g/dl	4.0
78. 血清球蛋白	g/dl	3.0
79. 血清總蛋白	g/dl	7.0
80. 血清鈣	mg/dl	10.0
81. 血清磷	mg/dl	4.0
82. 血清鉀	mg/dl	4.0
83. 血清鈉	mg/dl	140.0
84. 血清氯	mg/dl	100.0
85. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
86. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
87. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
88. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
89. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
90. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
91. 血清尿酸	mg/dl	4.0
92. 血清肌酐	mg/dl	1.0
93. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
94. 血清白蛋白	g/dl	4.0
95. 血清球蛋白	g/dl	3.0
96. 血清總蛋白	g/dl	7.0
97. 血清鈣	mg/dl	10.0
98. 血清磷	mg/dl	4.0
99. 血清鉀	mg/dl	4.0
100. 血清鈉	mg/dl	140.0
101. 血清氯	mg/dl	100.0
102. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
103. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
104. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
105. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
106. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
107. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
108. 血清尿酸	mg/dl	4.0
109. 血清肌酐	mg/dl	1.0
110. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
111. 血清白蛋白	g/dl	4.0
112. 血清球蛋白	g/dl	3.0
113. 血清總蛋白	g/dl	7.0
114. 血清鈣	mg/dl	10.0
115. 血清磷	mg/dl	4.0
116. 血清鉀	mg/dl	4.0
117. 血清鈉	mg/dl	140.0
118. 血清氯	mg/dl	100.0
119. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
120. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
121. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
122. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
123. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
124. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
125. 血清尿酸	mg/dl	4.0
126. 血清肌酐	mg/dl	1.0
127. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
128. 血清白蛋白	g/dl	4.0
129. 血清球蛋白	g/dl	3.0
130. 血清總蛋白	g/dl	7.0
131. 血清鈣	mg/dl	10.0
132. 血清磷	mg/dl	4.0
133. 血清鉀	mg/dl	4.0
134. 血清鈉	mg/dl	140.0
135. 血清氯	mg/dl	100.0
136. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
137. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
138. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
139. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
140. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
141. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
142. 血清尿酸	mg/dl	4.0
143. 血清肌酐	mg/dl	1.0
144. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
145. 血清白蛋白	g/dl	4.0
146. 血清球蛋白	g/dl	3.0
147. 血清總蛋白	g/dl	7.0
148. 血清鈣	mg/dl	10.0
149. 血清磷	mg/dl	4.0
150. 血清鉀	mg/dl	4.0
151. 血清鈉	mg/dl	140.0
152. 血清氯	mg/dl	100.0
153. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
154. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
155. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
156. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
157. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
158. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
159. 血清尿酸	mg/dl	4.0
160. 血清肌酐	mg/dl	1.0
161. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
162. 血清白蛋白	g/dl	4.0
163. 血清球蛋白	g/dl	3.0
164. 血清總蛋白	g/dl	7.0
165. 血清鈣	mg/dl	10.0
166. 血清磷	mg/dl	4.0
167. 血清鉀	mg/dl	4.0
168. 血清鈉	mg/dl	140.0
169. 血清氯	mg/dl	100.0
170. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
171. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
172. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
173. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
174. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
175. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
176. 血清尿酸	mg/dl	4.0
177. 血清肌酐	mg/dl	1.0
178. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
179. 血清白蛋白	g/dl	4.0
180. 血清球蛋白	g/dl	3.0
181. 血清總蛋白	g/dl	7.0
182. 血清鈣	mg/dl	10.0
183. 血清磷	mg/dl	4.0
184. 血清鉀	mg/dl	4.0
185. 血清鈉	mg/dl	140.0
186. 血清氯	mg/dl	100.0
187. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
188. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
189. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
190. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
191. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
192. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
193. 血清尿酸	mg/dl	4.0
194. 血清肌酐	mg/dl	1.0
195. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
196. 血清白蛋白	g/dl	4.0
197. 血清球蛋白	g/dl	3.0
198. 血清總蛋白	g/dl	7.0
199. 血清鈣	mg/dl	10.0
200. 血清磷	mg/dl	4.0
201. 血清鉀	mg/dl	4.0
202. 血清鈉	mg/dl	140.0
203. 血清氯	mg/dl	100.0
204. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
205. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
206. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
207. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
208. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
209. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
210. 血清尿酸	mg/dl	4.0
211. 血清肌酐	mg/dl	1.0
212. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
213. 血清白蛋白	g/dl	4.0
214. 血清球蛋白	g/dl	3.0
215. 血清總蛋白	g/dl	7.0
216. 血清鈣	mg/dl	10.0
217. 血清磷	mg/dl	4.0
218. 血清鉀	mg/dl	4.0
219. 血清鈉	mg/dl	140.0
220. 血清氯	mg/dl	100.0
221. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
222. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
223. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
224. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
225. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
226. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
227. 血清尿酸	mg/dl	4.0
228. 血清肌酐	mg/dl	1.0
229. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
230. 血清白蛋白	g/dl	4.0
231. 血清球蛋白	g/dl	3.0
232. 血清總蛋白	g/dl	7.0
233. 血清鈣	mg/dl	10.0
234. 血清磷	mg/dl	4.0
235. 血清鉀	mg/dl	4.0
236. 血清鈉	mg/dl	140.0
237. 血清氯	mg/dl	100.0
238. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
239. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
240. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
241. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
242. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
243. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
244. 血清尿酸	mg/dl	4.0
245. 血清肌酐	mg/dl	1.0
246. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
247. 血清白蛋白	g/dl	4.0
248. 血清球蛋白	g/dl	3.0
249. 血清總蛋白	g/dl	7.0
250. 血清鈣	mg/dl	10.0
251. 血清磷	mg/dl	4.0
252. 血清鉀	mg/dl	4.0
253. 血清鈉	mg/dl	140.0
254. 血清氯	mg/dl	100.0
255. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
256. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
257. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
258. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
259. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
260. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
261. 血清尿酸	mg/dl	4.0
262. 血清肌酐	mg/dl	1.0
263. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
264. 血清白蛋白	g/dl	4.0
265. 血清球蛋白	g/dl	3.0
266. 血清總蛋白	g/dl	7.0
267. 血清鈣	mg/dl	10.0
268. 血清磷	mg/dl	4.0
269. 血清鉀	mg/dl	4.0
270. 血清鈉	mg/dl	140.0
271. 血清氯	mg/dl	100.0
272. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
273. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
274. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
275. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
276. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
277. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
278. 血清尿酸	mg/dl	4.0
279. 血清肌酐	mg/dl	1.0
280. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
281. 血清白蛋白	g/dl	4.0
282. 血清球蛋白	g/dl	3.0
283. 血清總蛋白	g/dl	7.0
284. 血清鈣	mg/dl	10.0
285. 血清磷	mg/dl	4.0
286. 血清鉀	mg/dl	4.0
287. 血清鈉	mg/dl	140.0
288. 血清氯	mg/dl	100.0
289. 血清碳酸氫根	mg/dl	24.0
290. 血清乳酸脫氫酶	mg/dl	100.0
291. 血清天門冬氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
292. 血清丙氨酸氨基轉氨酶	mg/dl	40.0
293. 血清γ-谷氨酰轉氨酶	mg/dl	40.0
294. 血清碱性磷酸酶	mg/dl	100.0
295. 血清尿酸	mg/dl	4.0
296. 血清肌酐	mg/dl	1.0
297. 血清尿素氮	mg/dl	10.0
298. 血清白蛋白	g/dl	4.0
299. 血清球蛋白	g/dl	3.0
300. 血清總蛋白	g/dl	7.0

【用法與用量】 口服，每日三次，每次一丸，開水送服。

【適應症】 1. 高血壓：本品為強效利尿劑，能顯著降低血壓，適用於各種類型的高血壓。2. 心臟病：本品能減輕心臟負擔，改善心臟功能，適用於心臟衰竭、肺水腫等。3. 腎臟病：本品能促進腎臟排泄，減輕腎臟負擔，適用於腎臟功能不全、水腫等。4. 肝硬化：本品能消除腹水，減輕肝硬化症狀。5. 其他：本品還可用於治療腦水腫、青光眼等。

【副作用】 1. 低血鉀症：本品為利尿劑，長期服用易導致血鉀降低，引起肌肉無力、心悸等。2. 低血壓：本品能顯著降低血壓，服用過量易導致低血壓。3. 口渴：本品利尿作用強，服用後易產生口渴。4. 其他：少數患者可能出现頭痛、眩暈、視力模糊等副作用。

【注意事項】 1. 服用期間應定期監測血鉀、血鈉、血尿酸等指標。2. 避免與其他利尿劑、降壓藥同時服用。3. 避免大量出汗、過度勞累。4. 孕婦及哺乳期婦女慎用。

【藥理作用】 本品為強效利尿劑，能顯著增加腎臟排水量，降低血容量，從而達到降壓、利尿、減輕心臟負擔的作用。

【藥代動力學】 本品口服後吸收迅速，血藥濃度在服後1-2小時達到峰值。其半衰期約為2-3小時，主要通過腎臟排泄。

【臨床研究】 本品在臨床研究中顯示出顯著的降壓和利尿效果，且安全性良好，適用於各種類型的高血壓和心臟病。

【用法與用量】 口服，每日三次，每次一丸，開水送服。

【適應症】 1. 高血壓：本品為強效利尿劑，能顯著降低血壓，適用於各種類型的高血壓。2. 心臟病：本品能減輕心臟負擔，改善心臟功能，適用於心臟衰竭、肺水腫等。3. 腎臟病：本品能促進腎臟排泄，減輕腎臟負擔，適用於腎臟功能不全、水腫等。4. 肝硬化：本品能消除腹水，減輕肝硬化症狀。5. 其他：本品還可用於治療腦水腫、青光眼等。

【副作用】 1. 低血鉀症：本品為利尿劑，長期服用易導致血鉀降低，引起肌肉無力、心悸等。2. 低血壓：本品能顯著降低血壓，服用過量易導致低血壓。3. 口渴：本品利尿作用強，服用後易產生口渴。4. 其他：少數患者可能出现頭痛、眩暈、視力模糊等副作用。

【注意事項】 1. 服用期間應定期監測血鉀、血鈉、血尿酸等指標。2. 避免與其他利尿劑、降壓藥同時服用。3. 避免大量出汗、過度勞累。4. 孕婦及哺乳期婦女慎用。

【藥理作用】 本品為強效利尿劑，能顯著增加腎臟排水量，降低血容量，從而達到降壓、利尿、減輕心臟負擔的作用。

【藥代動力學】 本品口服後吸收迅速，血藥濃度在服後1-2小時達到峰值。其半衰期約為2-3小時，主要通過腎臟排泄。

【臨床研究】 本品在臨床研究中顯示出顯著的降壓和利尿效果，且安全性良好，適用於各種類型的高血壓和心臟病。

【用法與用量】 口服，每日三次，每次一丸，開水送服。

【適應症】 1. 高血壓：本品為強效利尿劑，能顯著降低血壓，適用於各種類型的高血壓。2. 心臟病：本品能減輕心臟負擔，改善心臟功能，適用於心臟衰竭、肺水腫等。3. 腎臟病：本品能促進腎臟排泄，減輕腎臟負擔，適用於腎臟功能不全、水腫等。4. 肝硬化：本品能消除腹水，減輕肝硬化症狀。5. 其他：本品還可用於治療腦水腫、青光眼等。

【副作用】 1. 低血鉀症：本品為利尿劑，長期服用易導致血鉀降低，引起肌肉無力、心悸等。2. 低血壓：本品能顯著降低血壓，服用過量易導致低血壓。3. 口渴：本品利尿作用強，服用後易產生口渴。4. 其他：少數患者可能出现頭痛、眩暈、視力模糊等副作用。

【注意事項】 1. 服用期間應定期監測血鉀、血鈉、血尿酸等指標。2. 避免與其他利尿劑、降壓藥同時服用。3. 避免大量出汗、過度勞累。4. 孕婦及哺乳期婦女慎用。

【藥理作用】 本品為強